

INSERTO



AFINITOR[®]
(everolimus) tabletas

Inhibidor de proteína-cinasas

 **NOVARTIS** | Reimagining Medicine





DESCRIPCIÓN Y COMPOSICIÓN



INDICACIONES



POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN



CONTRAINDICACIONES



ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES



REACCIONES ADVERSAS



INTERACCIONES



EMBARAZO, LACTANCIA, MUJERES
Y VARONES CON CAPACIDAD DE
PROCREAR



SOBREDOSIS



FARMACOLOGÍA CLÍNICA



ESTUDIOS CLÍNICOS



DATOS SOBRE TOXICIDAD
PRECLÍNICA



INCOMPATIBILIDADES



CONSERVACIÓN



INSTRUCCIONES DE USO Y
MANIPULACIÓN




DESCRIPCIÓN Y COMPOSICIÓN



DESCRIPCIÓN Y COMPOSICIÓN


Formas farmacéuticas



Comprimidos

Comprimidos de color blanco o ligeramente amarillento, alargados, de bordes biselados y sin ranura.

- 2,5 mg: los comprimidos tienen grabadas las inscripciones «LCL» de un lado y «NVR» del otro.
- 5 mg: los comprimidos tienen grabadas las inscripciones «5» de un lado y «NVR» del otro.
- 10 mg: los comprimidos tienen grabadas las inscripciones «UHE» de un lado y «NVR» del otro.



Comprimidos dispersables


Comprimidos de color blanco o ligeramente amarillento, redondos, planos, de bordes biselados y sin ranura.

- 2 mg: los comprimidos tienen grabadas las inscripciones «D2» de un lado y «NVR» del otro.
- 3 mg: los comprimidos tienen grabadas las inscripciones «D3» de un lado y «NVR» del otro.
- 5 mg: los comprimidos tienen grabadas las inscripciones «D5» de un lado y «NVR» del otro.

Dependiendo del país, ciertas presentaciones de Afinitor podrían no estar registradas.



Sustancia activa



Comprimidos

- 2,5 mg: cada comprimido contiene 2,5 mg de everólimus.
- 5 mg: cada comprimido contiene 5 mg de everólimus.
- 10 mg: cada comprimido contiene 10 mg de everólimus.




Comprimidos dispersables

- 2 mg: cada comprimido dispersable contiene 2 mg de everólimus.
- 3 mg: cada comprimido dispersable contiene 3 mg de everólimus.
- 5 mg: cada comprimido dispersable contiene 5 mg de everólimus.

Es posible que algunas dosis y formas farmacéuticas no estén disponibles en todos los países.




Excipientes



Comprimidos

Butilhidroxitolueno (E321), estearato de magnesio, lactosa monohidratada, hipromelosa, crospovidona y lactosa anhidra.



Comprimidos dispersables

Butilhidroxitolueno (E321), estearato de magnesio, lactosa monohidratada, hipromelosa, crospovidona, manitol, celulosa microcristalina y sílice coloidal anhidra.

Esta información puede variar de un país a otro.



INDICACIONES



Las indicaciones de Afinitor comprimidos incluyen:



- Mujeres posmenopáusicas con cáncer de mama avanzado y positividad de receptores hormonales, en combinación con un inhibidor de la aromatasa y después de una hormonoterapia.



- Pacientes con tumores neuroendocrinos (TNE) avanzados de origen gastrointestinal, pulmonar o pancreático.



- Pacientes con carcinoma de células renales (CCR) avanzado.



- Pacientes con complejo de esclerosis tuberosa (CET) asociado a un angiomiolipoma (AML) renal que no requiera cirugía inmediata

Afinitor en comprimidos y Afinitor en comprimidos dispersables están indicados para el tratamiento de:



- Pacientes con CET asociado a un astrocitoma subependimario de células gigantes (ASCG) que no requiera cirugía inmediata.



[Revisa la indicación por país aquí](#)





POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN




Afinitor se presenta en dos formas farmacéuticas:* comprimidos y comprimidos dispersables. Afinitor en comprimidos puede utilizarse en todas las indicaciones oncológicas aprobadas para el producto y en las indicaciones de CET asociado a ASCG y CET asociado a AML renal. Afinitor en comprimidos dispersables puede utilizarse para el tratamiento de pacientes con CET asociado a ASCG, debiéndose efectuar determinaciones periódicas de las concentraciones sanguíneas de everólimus (véanse el subapartado «Determinación de las concentraciones sanguíneas de everólimus» y el apartado FARMACOLOGÍA CLÍNICA).

Posología



El tratamiento con Afinitor debe ser instaurado por un médico experimentado en el uso de tratamientos antineoplásicos o en el tratamiento de pacientes con CET. El tratamiento debe continuar mientras se observen beneficios clínicos o mientras no ocurran reacciones adversas inaceptables.

Población destinataria general



Posología en pacientes con cáncer de mama avanzado con positividad de receptores hormonales, tumores neuroendocrinos avanzados de origen gastrointestinal, pulmonar o pancreático, carcinoma de células renales avanzado o CET asociado a angiomiolipoma renal:

La dosis recomendada de Afinitor en comprimidos es de 10 mg una vez al día (véase el apartado MODO DE ADMINISTRACIÓN).

*En ciertos países, no todas las presentaciones de Afinitor podrían estar registradas.



Posología en CET asociado a ASCG:

La posología se individualiza en función de la superficie corporal (SC, en m²) utilizando la fórmula de Dubois, en la que el peso (P) se expresa en kilogramos y la estatura (E), en centímetros:

$$SC = (P^{0,425} \times E^{0,725}) \times 0,007184$$

Dosis inicial y concentraciones mínimas deseables en pacientes con CET asociado a ASCG



La dosis diaria inicial de Afinitor recomendada para el tratamiento de pacientes con CET asociado a ASCG es de 4,5 mg/m², redondeada a la dosis farmacéutica más próxima de Afinitor en comprimidos o Afinitor en comprimidos dispersables. Se pueden combinar distintas dosis farmacéuticas de Afinitor en comprimidos para obtener la dosis deseada. Asimismo, se pueden combinar distintas dosis farmacéuticas de Afinitor en comprimidos dispersables para obtener la dosis deseada. Sin embargo, no se deben combinar las dos formas farmacéuticas para obtener la dosis deseada. La dosis debe ajustarse de modo que las concentraciones mínimas estén situadas entre 3 y 15 ng/ml.

Seguimiento de la dosis



En los pacientes con CET y ASCG es necesario determinar las concentraciones de everólimus en sangre (véase el subapartado «Determinación de las concentraciones sanguíneas de everólimus»). Se deben determinar las concentraciones mínimas de everólimus en la sangre aproximadamente entre 1 y 2 semanas después de comenzar el tratamiento o después de cualquier variación de la dosis.



Ajuste de la dosis



Para obtener una respuesta clínica óptima, la dosis debe ajustarse de forma individual para cada paciente incrementándola en pasos de 1 a 4 mg hasta alcanzar la concentración mínima deseable. Al planificar el ajuste de la dosis es necesario tener en cuenta la eficacia, la seguridad, la medicación simultánea y la concentración mínima que existe en ese momento. El ajuste personalizado de la dosis puede basarse en una simple fórmula proporcional:

Nueva dosis de everólimus = dosis actual × (concentración deseada / concentración actual)

Por ejemplo, supongamos que la dosis actual de un paciente basada en su superficie corporal es de 4 mg, con una concentración en el estado de equilibrio de 4 ng/ml. Para lograr una concentración deseable que supere el umbral de $C_{mín}$ de 5 ng/ml (p. ej., 8 ng/ml), la nueva dosis de everólimus sería de 8 mg (esto es, la dosis diaria actual debería incrementarse en 4 mg). Posteriormente debe determinarse la concentración mínima entre 1 y 2 semanas después de modificar la dosis.

Seguimiento de la dosis a largo plazo



En los pacientes con CET asociado a ASCG, se evaluará el volumen del ASCG unos 3 meses después de iniciar el tratamiento con Afinitor y se ajustará ulteriormente la dosis en función de las variaciones del volumen tumoral, la concentración mínima correspondiente y la tolerabilidad (véase el apartado FARMACOLOGÍA CLÍNICA).

En los pacientes con CET asociado a ASCG, una vez alcanzada una dosis estable deseada, se vigilarán las concentraciones mínimas cada 3 a 6 meses en los pacientes que presenten variaciones de la superficie corporal o cada 6 a 12 meses en aquellos cuya superficie corporal permanezca estable durante el tratamiento.



Modificaciones posológicas



Reacciones adversas:

El tratamiento de las reacciones adversas (RA) severas o intolerables puede exigir la interrupción temporal (con o sin reducción de la dosis) o la suspensión definitiva del tratamiento con Afinitor. Si se precisa reducirla, la dosis diaria propuesta es aproximadamente un 50% menor que la que se venía administrando (véase el apartado ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES). En el caso de reducciones de la dosis por debajo de la menor dosis farmacéutica disponible en comprimidos, debe estudiarse la posibilidad de administrar el medicamento en días alternos.

En la Tabla 1 se resumen las recomendaciones relativas a la reducción de la dosis y a la suspensión transitoria o definitiva de la administración de Afinitor ante la aparición de RA. También se ofrecen en su caso recomendaciones de actuación generales. El médico ha de utilizar su criterio clínico para orientar el plan terapéutico de cada paciente, sobre la base de un análisis de los beneficios y los riesgos del paciente en particular.



Tabla 1: Ajuste posológico de Afinitor y recomendaciones en caso de reacciones adversas

Reacción adversa	Severidad ^a	Ajuste posológico de Afinitor ^b y recomendaciones terapéuticas
Neumonitis no infecciosa	Grado 1 Asintomática, solo se hacen evaluaciones clínicas o diagnósticas; no precisa intervención	No es preciso ajustar la dosis. Instaurar las medidas de vigilancia pertinentes.
	Grado 2 Sintomática, precisa intervención farmacológica; dificulta las AIVD ^c	Contemplar la interrupción del tratamiento, descartar una infección y valorar el empleo de corticoesteroides hasta que los síntomas sean de grado ≤1. Reanudar el tratamiento en dosis más baja. Si el paciente no se recupera en 4 semanas, suspender definitivamente el tratamiento.
	Grado 3 Síntomas severos; limitación de las ABVD ^c ; precisa oxigenoterapia	Suspender el tratamiento hasta que los síntomas sean de grado ≤1. Descartar una infección y considerar un posible tratamiento con corticoesteroides. Plantearse reanudar el tratamiento en dosis más baja. Si reaparece una reacción de grado 3, estudiar la posibilidad de suspender definitivamente el tratamiento.
	Grado 4 Insuficiencia respiratoria; con riesgo vital; precisa intervención urgente (p. ej., traqueotomía o intubación)	Suspender el tratamiento, descartar una infección y considerar un posible tratamiento con corticoesteroides.



Tabla 1: Ajuste posológico de Afinitor y recomendaciones en caso de reacciones adversas

Reacción adversa	Severidad ^a	Ajuste posológico de Afinitor ^b y recomendaciones terapéuticas
Estomatitis	Grado 1 Asintomática o síntomas leves; no precisa intervención	No es preciso ajustar la dosis. Tratar con un colutorio que no contenga alcohol etílico o enjuagues con solución salina (0,9%) varias veces al día.
	Grado 2 Dolor moderado; no dificulta la ingestión; se precisa dieta blanda	Interrumpir transitoriamente la administración de Afinitor hasta que la reacción sea de grado ≤ 1 . Reanudar el tratamiento con la misma dosis. Si vuelve a aparecer una estomatitis de grado 2, interrumpir la administración hasta que sea de grado ≤ 1 . Reanudar el tratamiento en dosis más baja. Tratar la estomatitis con analgésicos o anestésicos bucales tópicos (como benzocaína, aminobenzoato de butilo, clorhidrato de tetracaína, mentol o fenol), combinados o no con corticoesteroides tópicos (como la triamcinolona en pasta oral)d.
	Grado 3 Dolor severo; dificulta la ingestión	Interrumpir transitoriamente la administración de Afinitor hasta que la reacción sea de grado ≤ 1 . Reanudar el tratamiento en dosis más baja. Tratar la estomatitis con analgésicos o anestésicos bucales tópicos (como benzocaína, aminobenzoato de butilo, clorhidrato de tetracaína, mentol o fenol), combinados o no con corticoesteroides tópicos (como la triamcinolona en pasta oral)d.
	Grado 4 Consecuencias potencialmente mortales; se precisa intervención urgente	Suspender definitivamente el tratamiento y dispensar el tratamiento médico adecuado.



Tabla 1: Ajuste posológico de Afinitor y recomendaciones en caso de reacciones adversas

Reacción adversa	Severidad ^a	Ajuste posológico de Afinitor ^b y recomendaciones terapéuticas
Otras reacciones adversas no hematológicas (excluidas las reacciones adversas metabólicas)	Grado 1	Si la toxicidad es tolerable, no es preciso ajustar la dosis. Instaurar el tratamiento médico adecuado y supervisar al paciente.
	Grado 2	Si la toxicidad es tolerable, no es preciso ajustar la dosis. Instaurar el tratamiento médico adecuado y supervisar al paciente. Si la toxicidad se vuelve intolerable, interrumpir transitoriamente la administración de Afinitor hasta que la reacción sea de grado ≤1. Reanudar el tratamiento con la misma dosis. Si reaparece una reacción de grado 2, interrumpir el tratamiento hasta que vuelva a ser de grado ≤1. Reanudar el tratamiento en dosis más baja.
	Grado 3	Interrumpir transitoriamente la administración de Afinitor hasta que la reacción sea de grado ≤1. Instaurar el tratamiento médico adecuado y supervisar al paciente. Plantearse reanudar el tratamiento en dosis más baja. Si reaparece una reacción de grado 3, estudiar la posibilidad de suspender definitivamente el tratamiento.
	Grado 4	Suspender definitivamente el tratamiento y dispensar el tratamiento médico adecuado.



Tabla 1: Ajuste posológico de Afinitor y recomendaciones en caso de reacciones adversas

Reacción adversa	Severidad ^a	Ajuste posológico de Afinitor ^b y recomendaciones terapéuticas
Reacciones adversas metabólicas (p. ej., hiperglucemia, dislipidemia)	Grado 1	No es preciso ajustar la dosis. Instaurar el tratamiento médico adecuado y supervisar al paciente.
	Grado 2	No es preciso ajustar la dosis. Instaurar el tratamiento médico adecuado y supervisar al paciente.
	Grado 3	Interrumpir transitoriamente la administración de Afinitor. Reanudar el tratamiento en dosis más baja. Instaurar el tratamiento médico adecuado y supervisar al paciente.
	Grado 4	Suspender definitivamente el tratamiento y dispensar el tratamiento médico adecuado.
Trombocitopenia (disminución de la cifra de plaquetas)	Grado 1 ($< \text{LIN}^e - 75\,000/\text{mm}^3$; $< \text{LIN}^e - 75,0 \times 10^9/\text{l}$)	No es preciso ajustar la dosis.
	Grado 2 ($< 75\,000 - 50\,000/\text{mm}^3$; $< 75,0 - 50,0 \times 10^9/\text{l}$)	Interrumpir transitoriamente la administración de Afinitor hasta que la reacción sea de grado ≤ 1 . Reanudar el tratamiento con la misma dosis.
	Grado 3 ($< 50\,000 - 25\,000/\text{mm}^3$; $< 50,0 - 25,0 \times 10^9/\text{l}$) O	Interrumpir transitoriamente la administración de Afinitor hasta que la reacción sea de grado ≤ 1 . Reanudar el tratamiento en dosis más baja.
	Grado 4 ($< 25\,000/\text{mm}^3$; $< 25,0 \times 10^9/\text{l}$)	



Tabla 1: Ajuste posológico de Afinitor y recomendaciones en caso de reacciones adversas

Reacción adversa	Severidad ^a	Ajuste posológico de Afinitor ^b y recomendaciones terapéuticas
Neutropenia (disminución de la cifra de neutrófilos)	Grado 1 (<LINE-1500/mm ³ ; <LIN ^e -1,5 × 10 ⁹ /l) O	No es preciso ajustar la dosis.
	Grado 2 (<1500-1000/mm ³ ; <1,5-1,0 × 10 ⁹ /l)	
	Grado 3 (<1000-500/mm ³ ; <1,0-0,5 × 10 ⁹ /l)	Interrumpir transitoriamente la administración de Afinitor hasta que la reacción sea de grado ≤2. Reanudar el tratamiento con la misma dosis.
	Grado 4 (<500/ mm ³ ; <0,5 × 10 ⁹ /l)	Interrumpir transitoriamente la administración de Afinitor hasta que la reacción sea de grado ≤2. Reanudar el tratamiento en dosis más baja.
Neutropenia febril	Grado 3 RAN ^f <1000/mm ³ con una sola medición de >38,3 °C (101 °F) o temperatura de ≥38 °C (100,4 °F) persistente durante más de 1 hora.	Interrumpir transitoriamente la administración de Afinitor hasta que la reacción sea de grado ≤2 y la fiebre haya desaparecido. Reanudar el tratamiento en dosis más baja.
	Grado 4 Consecuencias potencialmente mortales; se precisa intervención urgente	Interrumpir definitivamente el tratamiento.


^a Descripción de la severidad: 1 = síntomas leves; 2 = síntomas moderados; 3 = síntomas severos; 4 = síntomas potencialmente mortales. Los grados de severidad corresponden a los criterios terminológicos comunes para la clasificación de eventos adversos (CTCAE, versión 4.03) del Instituto Nacional del Cáncer (National Cancer Institute, NCI) de los Estados Unidos. ^b Si es preciso disminuir la dosis, se propone una reducción aproximada del 50% respecto a la dosis administrada hasta el momento. ^c AIVD: actividades instrumentales de la vida diaria; ABVD: actividades básicas de la vida diaria ^d Evítese el uso de productos que contengan alcohol etílico, peróxido de hidrógeno, yodo o derivados del tomillo para tratar la estomatitis, ya que pueden agravar las úlceras bucales. ^e Límite inferior de la normalidad (LIN) ^f Recuento absoluto de neutrófilos (RAN)






Inhibidores moderados de la CYP3A4 o de la gpP

Se debe tener cautela a la hora de administrar Afinitor con inhibidores moderados de la CYP3A4 o de la gpP. Si es necesario coadministrar un inhibidor moderado de la CYP3A4 o de la gpP, debe reducirse la dosis diaria de Afinitor en un 50% aproximadamente. Puede resultar necesario reducir aún más la dosis para contrarrestar las reacciones adversas. Cuando haya que reducir la dosis por debajo de la menor dosis farmacéutica disponible, se debe estudiar la posibilidad de administrar el medicamento en días alternos (véanse los apartados ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES e INTERACCIONES).



Cáncer de mama avanzado con positividad de receptores hormonales, tumores neuroendocrinos avanzados de origen gastrointestinal, pulmonar o pancreático, carcinoma de células renales avanzado y CET asociado a angiomiolipoma renal: Si se deja de administrar el inhibidor moderado de la CYP3A4 o de la gpP, conviene plantearse un período de depuración de al menos 2 a 3 días (plazo medio para la mayoría de los inhibidores moderados más utilizados) antes de aumentar la dosis de Afinitor. Transcurrido dicho plazo se debe volver a la dosis de Afinitor anterior a la administración del inhibidor moderado de la CYP3A4 o de la gpP (véanse los apartados ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES e INTERACCIONES).



CET asociado a ASCG: Se deben determinar las concentraciones mínimas de everólimus entre 1 y 2 semanas después de la adición de un inhibidor moderado de la CYP3A4 o de la gpP. Si se deja de administrar el inhibidor, se debe volver a la dosis de Afinitor que se estaba utilizando antes de comenzar a administrar el inhibidor y determinar la concentración mínima de everólimus unas 2 semanas después (véanse el subapartado Determinación de las concentraciones sanguíneas de everólimus y los apartados ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES e INTERACCIONES).



Inductores potentes de la CYP3A4


Se debe evitar el uso simultáneo de inductores potentes de la CYP3A4.



Cáncer de mama avanzado con positividad de receptores hormonales, tumores neuroendocrinos avanzados de origen gastrointestinal, pulmonar o pancreático, carcinoma de células renales avanzado y CET asociado a angiomiolipoma renal: Si es preciso administrar simultáneamente un inductor potente de la CYP3A4, estudie la posibilidad de duplicar la dosis diaria de Afinitor (recomendación que se basa en datos farmacocinéticos experimentales) aplicando incrementos de 5 mg o menos. Previsiblemente, esta dosis de Afinitor hará que el AUC permanezca dentro del intervalo de valores que se observan cuando no se administran inductores.

No obstante, no existen datos clínicos para este ajuste posológico en pacientes tratados con inductores potentes de la CYP3A4. Si se deja de administrar el inductor potente, conviene plantearse un período de depuración de al menos 3 a 5 días (plazo razonable para lograr una desinducción significativa de la enzima), antes de volver a la dosis de Afinitor que se estaba utilizando con anterioridad a la instauración del inductor potente de la CYP3A4 (véanse los apartados ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES e INTERACCIONES).

CET asociado a ASCG:



- Los pacientes con ASCG que reciban simultáneamente inductores potentes de la CYP3A4 (por ejemplo, carbamazepina, fenobarbital o fenitoína, sendos antiepilépticos inductores de enzimas) al inicio del tratamiento pueden necesitar una dosis mayor de Afinitor para lograr concentraciones mínimas de entre 3 y 15 ng/ml. Debe duplicarse la dosis diaria de Afinitor y evaluarse la tolerabilidad. Se determinará la concentración mínima de everólimus aproximadamente dos semanas después de duplicar la dosis y se ajustará de nuevo la dosis en incrementos de 1 a 4 mg, según resulte necesario, para mantener la concentración mínima deseada.



- En pacientes con ASCG que no reciban simultáneamente un inductor potente al comienzo del tratamiento con everólimus, la adición de un inductor potente puede hacer necesario un aumento de la dosis de Afinitor. Debe duplicarse la dosis diaria de Afinitor y evaluarse la tolerabilidad. Se determinará la concentración mínima de everólimus aproximadamente dos semanas después de duplicar la dosis y se ajustará de nuevo la dosis, si procede, en incrementos de 1 a 4 mg, según resulte necesario, para mantener la concentración mínima deseada.




- La adición de otro inductor potente de la CYP3A4 puede no requerir un ajuste adicional de la dosis. Se determinará la concentración mínima de everólimus aproximadamente dos semanas después de comenzar a administrar el inductor adicional y se ajustará la dosis en incrementos de 1 a 4 mg, según resulte necesario, para mantener la concentración mínima deseada.



- La suspensión de la administración de uno de los múltiples inductores potentes de la CYP3A4 puede no requerir un ajuste adicional de la dosis. Se determinará la concentración mínima de everólimus aproximadamente dos semanas después de suspender la administración de uno de los múltiples inductores potentes de la CYP3A4. Si se dejan de administrar todos los inductores potentes, conviene plantearse un período de depuración de al menos 3 a 5 días (plazo razonable para lograr una desinducción significativa de la enzima), antes de volver a la dosis de Afinitor que se estaba utilizando con anterioridad a la instauración del primero de los inductores potentes de la CYP3A4. Se determinará la concentración mínima de everólimus aproximadamente dos semanas después (véanse el subapartado Determinación de las concentraciones sanguíneas de everólimus y los apartados ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES e INTERACCIONES).



Poblaciones especiales



Pacientes pediátricos (menores de 18 años)

- No se recomienda el uso de Afinitor en pacientes pediátricos con cáncer.
- No se recomienda el uso de Afinitor en pacientes pediátricos con CET asociado a angiomiolipoma renal.
- No se ha estudiado el efecto de Afinitor en niños menores de 1 año con CET asociado a ASCG.
- Las recomendaciones posológicas en pacientes pediátricos con CET asociado a ASCG coinciden con las de la población adulta correspondiente, salvo en el caso de pacientes con disfunción hepática.
- No se recomienda tratar con Afinitor a pacientes menores de 18 años con disfunción hepática y con CET asociado a ASCG.



Pacientes geriátricos (mayores de 65 años)

No es necesario ajustar la dosis (véase el apartado FARMACOLOGÍA CLÍNICA).




Disfunción renal

No es necesario ajustar la dosis (véase el apartado FARMACOLOGÍA CLÍNICA).



Disfunción hepática

Cáncer de mama avanzado con positividad de receptores hormonales, tumores neuroendocrinos avanzados de origen gastrointestinal, pulmonar o pancreático, carcinoma de células renales avanzado y CET asociado a angiomiolipoma renal:




- Disfunción hepática leve (clase A de Child-Pugh): la dosis recomendada es de 7,5 mg al día.
- Disfunción hepática moderada (clase B de Child-Pugh): la dosis recomendada es de 5 mg al día; si no se tolera bien, puede reducirse a 2,5 mg.
- Disfunción hepática severa (clase C de Child-Pugh): no se recomienda. En caso de que el beneficio deseado justifique los riesgos, no debe sobrepasarse la dosis máxima diaria de 2,5 mg.

Deberá ajustarse la dosis si el estado funcional hepático del paciente (es decir, la clase de Child-Pugh) cambia durante el tratamiento.

CET asociado a ASCG:

Pacientes mayores de 18 años



- Disfunción hepática leve (clase A de Child-Pugh): el 75% de la dosis calculada basándose en la SC (redondeada a la dosis farmacéutica más próxima).
- Disfunción hepática moderada (clase B de Child-Pugh): el 50% de la dosis calculada basándose en la SC (redondeada a la dosis farmacéutica más próxima).
- Disfunción hepática severa (clase C de Child-Pugh): no se recomienda. En caso de que el beneficio deseado justifique los riesgos, no debe sobrepasarse el 25% de la dosis calculada basándose en la SC (redondeada a la dosis farmacéutica más próxima).



Se deben determinar las concentraciones mínimas de everólimus en la sangre aproximadamente de 1 a 2 semanas después de comenzar el tratamiento o después de cualquier variación del estado funcional hepático del paciente (clase de Child-Pugh). En pacientes con ASCG, la dosis debe ajustarse para alcanzar concentraciones mínimas comprendidas entre 3 y 15 ng/ml (véase el subapartado «Determinación de las concentraciones sanguíneas de everólimus»). Deberá ajustarse la dosis si el estado funcional hepático del paciente (es decir, la clase de Child-Pugh) cambia durante el tratamiento (véase el apartado FARMACOLOGÍA CLÍNICA).



Pacientes menores de 18 años

- No se recomienda tratar con Afinitor a pacientes menores de 18 años con CET asociado a ASCG y disfunción hepática.

Determinación de las concentraciones sanguíneas de everólimus



Es preciso determinar las concentraciones sanguíneas de everólimus en los pacientes tratados por CET asociado a ASCG utilizando un método bioanalítico validado de cromatografía de líquidos acoplada a espectrometría de masas (LC-MS). Siempre que sea posible, dicha determinación se llevará a cabo utilizando el mismo método y el mismo laboratorio durante todo el tratamiento.

Se medirán las concentraciones mínimas de 1 a 2 semanas después de la dosis inicial, después de cada cambio de forma farmacéutica, después de iniciar o modificar la coadministración de inhibidores de la CYP3A4 o la gpP (véanse los apartados ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES e INTERACCIONES), y después de cualquier variación del estado funcional hepático (clase de Child-Pugh) (véanse los apartados POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN y FARMACOLOGÍA CLÍNICA).




Se medirán las concentraciones mínimas aproximadamente 2 semanas después de iniciar o modificar la coadministración de inductores de la CYP3A4 o la gpP (véanse los apartados ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES e INTERACCIONES). La dosis deberá ajustarse con el objetivo de alcanzar concentraciones mínimas de everólimus comprendidas entre 3 y 15 ng/ml en el caso de pacientes con CET y ASCG, siempre que la correspondiente dosis resulte tolerable (véase el apartado FARMACOLOGÍA CLÍNICA). Con miras a lograr una eficacia óptima, y si la tolerabilidad lo permite, se puede aumentar la dosis para alcanzar concentraciones mínimas más altas dentro de ese intervalo.

Modo de administración

Afinitor se debe administrar por vía oral una vez al día, siempre a la misma hora, ya sea sistemáticamente con alimentos o sistemáticamente sin alimentos (véase el apartado FARMACOLOGÍA CLÍNICA).


Afinitor en comprimidos



Los comprimidos se deben tragar enteros con un vaso de agua. No se deben masticar ni triturar. En el caso de los pacientes con CET asociado a ASCG que no puedan tragar comprimidos enteros, es posible disgregar los comprimidos de Afinitor en un vaso de agua (que contenga unos 30 ml) removiendo suavemente hasta que se hayan disgregado por completo (aproximadamente 7 minutos) e inmediatamente después beber todo el contenido del vaso. Se debe enjuagar el vaso con un volumen igual de agua y beber todo el líquido que queda en el vaso para garantizar la administración de la dosis completa (véase el apartado FARMACOLOGÍA CLÍNICA).



Afinitor en comprimidos dispersables



Los comprimidos dispersables deben tomarse únicamente como suspensión y no tragarse enteros, masticarse ni triturarse. La suspensión puede prepararse en una jeringa para uso oral o en un vaso pequeño. Es importante asegurarse de que se administra la dosis completa. Administre la suspensión inmediatamente después de prepararla. Deséchela si no la administra en un plazo máximo de 60 minutos desde su preparación. Utilice únicamente agua para preparar la suspensión. En el apartado INSTRUCCIONES DE USO Y MANIPULACIÓN de este prospecto se proporciona una serie completa e ilustrada de instrucciones para los comprimidos dispersables.


Administración mediante una jeringa para uso oral:

- Introduzca la dosis indicada de Afinitor en comprimidos dispersables en una jeringa de 10 ml. No supere un total de 10 mg por jeringa. Si se necesita una dosis más alta, prepare una jeringa suplementaria. No fragmente ni triture los comprimidos.
- Introduzca unos 5 ml de agua y 4 ml de aire en la jeringa.
- Deje la jeringa llena en un recipiente (con la punta dirigida hacia arriba) durante 3 minutos hasta que los comprimidos dispersables de Afinitor queden en suspensión.
- Invierta con suavidad la jeringa 5 veces inmediatamente antes de administrar el contenido.
- Una vez administrada la suspensión preparada, introduzca en la misma jeringa aproximadamente 5 ml de agua y 4 ml de aire y mueva en círculos el contenido para suspender las partículas residuales. Administre todo el contenido de la jeringa.





Administración con un vaso pequeño:



- Introduzca la dosis indicada de Afinitor en comprimidos dispersables en un vaso pequeño (con un volumen máximo de 100 ml) que contenga unos 25 ml de agua. No supere un total de 10 mg de Afinitor en comprimidos dispersables por vaso. Si se necesita una dosis más alta, prepare un vaso suplementario. No fragmente ni triture los comprimidos.
- Espere 3 minutos para dar tiempo a que se forme la suspensión.
- Remueva suavemente el contenido con una cucharita inmediatamente antes de beberlo.
- Una vez administrada la suspensión preparada, añada 25 ml de agua y remueva con la misma cucharita para volver a suspender las partículas restantes. Administre todo el contenido del vaso.

Cambio de una forma farmacéutica a otra:

Las dos formas farmacéuticas (Afinitor en comprimidos y Afinitor en comprimidos dispersables) no son intercambiables. No deben combinarse ambas formas farmacéuticas para obtener la dosis deseada. Debe utilizarse siempre la misma forma farmacéutica, del modo adecuado para la indicación de que se trate. Cuando se cambie de una forma farmacéutica a otra, se ajustará la dosis redondeándola a la dosis farmacéutica más próxima (en miligramos) de la nueva formulación y se determinará la concentración mínima de everólimus aproximadamente de 1 a 2 semanas después (véase el apartado «Determinación de las concentraciones sanguíneas de everólimus»).



Dosis omitidas

Afinitor se puede tomar hasta 6 horas después de la hora habitual. Si pasaron más de 6 horas, debe omitirse la dosis de ese día y al día siguiente se debe tomar la dosis de Afinitor a la hora habitual. No debe tomarse una dosis doble para compensar la omitida.



CONTRAINDICACIONES

Afinitor está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad a la sustancia activa, a otros derivados de la rapamicina o a cualquiera de los excipientes (véase el apartado ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES).




ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES



Este medicamento contiene butilhidroxitolueno, puede producir reacciones locales en la piel como dermatitis por contacto o irritación de los ojos y membrana mucosa. Este producto contiene lactosa. Los pacientes con intolerancia hereditaria a galactosa, insuficiencia de lactasa de Lapp o malabsorción de glucosa o galactosa no deben tomar este medicamento. Tener en cuenta en el tratamiento de los pacientes con diabetes mellitus.

Neumonitis no infecciosa



La neumonitis no infecciosa es un efecto de clase farmacológica común a todos los derivados de la rapamicina. Se han descrito casos de neumonitis no infecciosa (como la enfermedad pulmonar intersticial) en pacientes que tomaban Afinitor (véase el apartado REACCIONES ADVERSAS). Algunos de ellos fueron severos y, en raras ocasiones, mortales. Se debe considerar un posible diagnóstico de neumonitis no infecciosa en los pacientes que presenten signos y síntomas respiratorios inespecíficos, como hipoxia, derrame pleural, tos o disnea, en quienes se hayan descartado las causas infecciosas o neoplásicas y otras causas no farmacológicas por medio de estudios apropiados. En el diagnóstico diferencial de la neumonitis no infecciosa, deben descartarse las infecciones oportunistas como la neumonía por *Pneumocystis jirovecii* (véase el subapartado «Infecciones»).

Se debe pedir al paciente que comunique sin demora cualquier nuevo síntoma respiratorio o empeoramiento de los ya existentes. Los pacientes que muestren signos radiológicos indicativos de neumonitis no infecciosa, pero permanezcan asintomáticos o con síntomas leves, pueden continuar su tratamiento con Afinitor sin modificar la dosis (véase la Tabla 1 del apartado POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN). Si los síntomas son moderados (grado 2), debe considerarse la posibilidad de interrumpir el tratamiento hasta que mejoren. Puede resultar necesario el uso de corticosteroides. La administración de Afinitor podrá reanudarse con una dosis diaria inferior en un 50% aproximadamente a la dosis empleada anteriormente.



En los casos de neumonitis no infecciosa de grado 3, se interrumpirá el tratamiento con Afinitor hasta que la neumonitis pase a ser de grado 1 o menor. La administración de Afinitor podrá reanudarse con una dosis diaria inferior en un 50% aproximadamente a la dosis empleada anteriormente, según las circunstancias clínicas del paciente. Si vuelve a aparecer una neumonitis no infecciosa de grado 3, se estudiará la posibilidad de suspender definitivamente el tratamiento con Afinitor. En los casos de neumonitis no infecciosa de grado 4 se debe suspender definitivamente el tratamiento con Afinitor. Puede estar indicado administrar corticoesteroides hasta que los síntomas clínicos desaparezcan.



Si el paciente requiere corticoesteroides para el tratamiento de una neumonitis no infecciosa, debe plantearse la administración de profilaxis contra la neumonía por *P. jirovecii*. También se ha descrito la aparición de neumonitis con dosis reducidas (véase la Tabla 1 del apartado POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN).

Infecciones

Afinitor tiene propiedades inmunodepresoras y puede hacer que los pacientes sean más propensos a contraer bacteriosis, micosis, virosis o infestaciones por protozoos, incluidas las infecciones por microorganismos patógenos oportunistas (véase el apartado REACCIONES ADVERSAS). Se han descrito infecciones locales y sistémicas —entre las que figuran neumonías y otras bacteriosis, micosis invasoras como aspergilosis, candidiasis o neumonía por *P. jirovecii* y virosis como la reactivación del virus de la hepatitis B— en pacientes tratados con Afinitor. Algunas de esas infecciones fueron severas (p. ej., provocaron una sepsis [incluido el shock séptico] o una insuficiencia respiratoria o hepática) y, ocasionalmente, mortales en pacientes adultos y pediátricos (véase el apartado REACCIONES ADVERSAS).



Los médicos y los pacientes deben ser conscientes del mayor riesgo de infecciones con Afinitor. Antes de instaurar el tratamiento con Afinitor deben tratarse las infecciones en curso. Durante el tratamiento con Afinitor se debe estar atento a los síntomas y signos de infección; si se diagnostica una infección, hay que instaurar de inmediato el tratamiento adecuado y estudiar la posibilidad de suspender temporal o definitivamente la administración de Afinitor.



Si se diagnostica una micosis sistémica invasora, suspenda la administración de Afinitor e inicie un tratamiento antimicótico apropiado. Se han descrito casos de neumonía por *P. jirovecii*, algunos de ellos mortales, en pacientes tratados con everólimus. La neumonía por *P. jirovecii* puede estar asociada a la administración concomitante de corticoesteroides u otros inmunodepresores. Debe plantearse la administración de profilaxis contra la neumonía por *P. jirovecii* si el paciente debe recibir simultáneamente corticoesteroides u otros inmunodepresores.

Reacciones de hipersensibilidad



Con el uso de everólimus se han descrito reacciones de hipersensibilidad con síntomas tales como anafilaxia, disnea, sofocos o rubores, dolor torácico o angioedema (hinchazón de las vías respiratorias o de la lengua, con o sin dificultad para respirar), entre otros (véase el apartado CONTRAINDICACIONES).

Angioedema en pacientes tratados simultáneamente con inhibidores de la enzima convertora de la angiotensina (IECA)

El tratamiento simultáneo con IECA puede incrementar el riesgo de angioedema (hinchazón de las vías respiratorias o de la lengua, con o sin dificultad para respirar).



Estomatitis



La estomatitis (término que comprende las úlceras orales y la mucositis oral) es la reacción adversa notificada con más frecuencia en los pacientes tratados con Afinitor (véase el apartado REACCIONES ADVERSAS). Suele aparecer en las primeras 8 semanas de tratamiento. En caso de estomatitis se recomiendan los tratamientos tópicos, evitando no obstante los productos que contengan alcohol etílico, peróxido de hidrógeno, yodo o derivados del tomillo, ya que pueden agravar el problema (véase la Tabla 1 en el apartado POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN). No se deben utilizar antimicóticos salvo que se haya diagnosticado una micosis (véase el apartado INTERACCIONES).

En un estudio de un solo grupo realizado con 92 pacientes posmenopáusicas con cáncer de mama se administró en forma de colutorio una solución oral de corticoesteroides sin alcohol etílico durante las primeras 8 semanas de tratamiento con Afinitor y exemestano, y se observó una reducción clínicamente significativa de la incidencia y la severidad de las estomatitis (véase el apartado REACCIONES ADVERSAS).

Casos de insuficiencia renal



Se han descrito casos de insuficiencia renal (incluso de insuficiencia renal aguda), algunos con desenlace mortal, en pacientes tratados con Afinitor. Se debe vigilar la función renal de los pacientes, especialmente si existen factores de riesgo adicionales que puedan deteriorarla (véase el subapartado «Vigilancia y pruebas de laboratorio» y el apartado REACCIONES ADVERSAS).



Vigilancia y pruebas de laboratorio



Función renal

Se han notificado aumentos, generalmente leves, de la creatinina sérica, así como proteinuria en pacientes tratados con Afinitor (véase el apartado REACCIONES ADVERSAS). Se recomienda vigilar la función renal, lo que incluye la determinación del nitrógeno ureico en sangre (BUN), la proteinuria o la creatinina sérica, antes de iniciar el tratamiento con Afinitor y periódicamente durante dicho tratamiento.



Glucemia

Se ha observado hiperglucemia en pacientes en tratamiento con Afinitor (véase el apartado REACCIONES ADVERSAS). Se aconseja vigilar la glucemia en ayunas antes de comenzar el tratamiento con Afinitor y periódicamente durante dicho tratamiento. Se recomienda una vigilancia más frecuente en los pacientes que, además de Afinitor, reciban otros fármacos que puedan causar hiperglucemia. Se debe lograr un control óptimo de la glucemia antes de comenzar el tratamiento con Afinitor.



Lípidos en sangre

Se han observado casos de dislipidemia (hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia, entre otros) en pacientes en tratamiento con Afinitor. Se recomienda vigilar la colesterolemia y la trigliceridemia antes de comenzar el tratamiento con Afinitor, y periódicamente durante dicho tratamiento, así como instaurar el tratamiento médico pertinente en caso necesario.



Parámetros hematológicos

Se ha observado disminución de las cifras de hemoglobina, linfocitos, plaquetas y neutrófilos en pacientes en tratamiento con Afinitor (véase el apartado REACCIONES ADVERSAS). Se aconseja solicitar un hemograma completo antes de comenzar el tratamiento con Afinitor y periódicamente durante dicho tratamiento.



Interacciones



Se debe evitar la administración de Afinitor con inhibidores potentes de la CYP3A4 o de la gpP (véase el apartado INTERACCIONES). Se debe tener cautela a la hora de administrar Afinitor con inhibidores moderados de la CYP3A4 o de la gpP. Si fuera preciso administrar Afinitor con un inhibidor moderado de la CYP3A4 o de la gpP, se supervisará estrechamente al paciente por si se producen efectos adversos y, en caso necesario, se reducirá la dosis de Afinitor (véanse los apartados POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN e INTERACCIONES).

Se debe evitar la administración de Afinitor con inductores potentes de la CYP3A4 o de la gpP (véase el apartado INTERACCIONES). Si debe administrarse Afinitor junto con un inductor potente de la CYP3A4 o de la gpP, deberá vigilarse estrechamente la respuesta clínica del paciente. Se debe considerar la posibilidad de aumentar la dosis de Afinitor si este se administra con inductores potentes de la CYP3A4 o de la gpP por no ser posible recurrir a un tratamiento alternativo (véanse los apartados POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN e INTERACCIONES). Se debe tener cuidado a la hora de administrar Afinitor con sustratos de la CYP3A4 orales de margen terapéutico reducido, pues cabe la posibilidad de que se produzcan interacciones farmacológicas. Si Afinitor se administra con dichos sustratos, es necesario observar al paciente por si se manifiestan los efectos adversos descritos en el prospecto del sustrato en cuestión (véase el apartado INTERACCIONES).

Disfunción hepática

Se ha observado una mayor exposición al everólimus en pacientes con disfunción hepática leve (clase A de Child-Pugh), moderada (clase B de Child-Pugh) o severa (clase C de Child-Pugh) (véase el apartado FARMACOLOGÍA CLÍNICA). No se recomienda tratar con Afinitor a pacientes de ≥ 18 años que presenten disfunción hepática severa (clase C de Child-Pugh), salvo que el posible beneficio justifique el riesgo (véanse los apartados POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN y FARMACOLOGÍA CLÍNICA). No se recomienda tratar con Afinitor a pacientes menores de 18 años con CET asociado a ASCG que presenten disfunción hepática (clases A, B o C de Child-Pugh) (véanse los apartados POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN y FARMACOLOGÍA CLÍNICA).



Vacunas




Durante el tratamiento con Afinitor se ha de evitar la administración de vacunas elaboradas con microorganismos vivos, así como el contacto estrecho con personas que hayan recibido tales vacunas (véase el apartado INTERACCIONES). En el caso de los pacientes pediátricos con CET asociado a ASCG que no requieran tratamiento inmediato, antes de comenzar el tratamiento se administrarán todas las vacunas de virus vivos recomendadas por el calendario de vacunación infantil de conformidad con las directrices nacionales en materia de vacunación.

Complicaciones de la cicatrización de heridas



La cicatrización deficiente de heridas es un efecto general de los derivados de la rapamicina, entre ellos el everólimus, por lo que se impone la cautela al utilizar Afinitor en el período periquirúrgico.

Complicaciones de la radioterapia




Se han notificado reacciones severas a la radiación (como esofagitis, neumonitis y lesión cutánea por radiación) cuando se administró everólimus durante la radioterapia o justo después de la misma. Por lo tanto, se debe tener cuidado en los pacientes que reciban everólimus en estrecha relación temporal con la radioterapia. Además, se ha notificado síndrome de hipersensibilización por irradiación (*radiation recall syndrome*) en pacientes tratados con everólimus que anteriormente se habían sometido a radioterapia.



REACCIONES ADVERSAS



Oncología: resumen del perfil toxicológico



La información sobre reacciones adversas (RA), presuntamente relacionadas con el tratamiento según el investigador, se basa en los datos de seguridad agrupados de los pacientes que recibieron Afinitor (N = 2672) en los estudios clínicos de fase III aleatorizados, con doble enmascaramiento y comparativos con placebo o con tratamiento activo y los estudios de fase II relativos a las indicaciones oncológicas autorizadas.

Las RA más frecuentes (con una incidencia $\geq 1/10$ y presuntamente relacionadas con el tratamiento según el investigador), considerando los datos de seguridad agrupados, fueron (en orden decreciente de frecuencia): estomatitis, erupción, fatiga, diarrea, infecciones, náuseas, disminución del apetito, anemia, disgeusia, neumonitis, edema periférico, hiperglucemia, astenia, prurito, pérdida de peso, hipercolesterolemia, epistaxis, tos y cefalea.

Las RA de grado 3 o 4 más frecuentes (con una incidencia $\geq 1/100$ y $< 1/10$ y presuntamente relacionadas con el tratamiento según el investigador) fueron las siguientes: estomatitis, anemia, hiperglucemia, fatiga, infecciones, neumonitis, diarrea, astenia, trombocitopenia, neutropenia, disnea, linfopenia, proteinuria, hemorragia, hipofosfatemia, erupción, hipertensión arterial, aumento de la aspartato-transaminasa (AST), aumento de la alanina-transaminasa (ALT), neumonía y diabetes *mellitus*.



Resumen tabulado de las reacciones adversas observadas en los estudios clínicos oncológicos



En la Tabla 2 se presentan las categorías de frecuencia de las reacciones adversas registradas en el análisis de los datos conjuntos de seguridad. Las reacciones adversas se enumeran con arreglo a las clases principales de órganos, aparatos o sistemas del MedDRA. En cada clase, las reacciones adversas se enumeran por orden decreciente de frecuencia. En cada categoría de frecuencia, las reacciones adversas se presentan por orden de frecuencia decreciente. Además, se indica la categoría de frecuencia correspondiente según la convención siguiente (CIOMS III): muy frecuentes ($\geq 1/10$); frecuentes ($\geq 1/100$, $< 1/10$); infrecuentes ($\geq 1/1000$, $< 1/100$); raras ($\geq 1/10\ 000$, $< 1/1000$); muy raras ($< 1/10\ 000$).

Tabla 2: Reacciones adversas observadas en los estudios oncológicos



Infecciones e infestaciones

Muy frecuentes

Infecciones^a



Trastornos de la sangre y del sistema linfático

Muy frecuentes

Anemia

Frecuentes

Trombocitopenia, neutropenia, leucopenia, linfopenia

Infrecuentes

Pancitopenia

Raras

Aplasia eritrocitaria pura



Tabla 2: Reacciones adversas observadas en los estudios oncológicos

	Trastornos del sistema inmunitario
Infrecuentes	Hipersensibilidad
	Trastornos del metabolismo y de la nutrición
Muy frecuentes	Apetito disminuido, hiperglucemia, hipercolesterolemia
Frecuentes	Hipertrigliceridemia, hipofosfatemia, diabetes <i>mellitus</i> , hiperlipidemia, hipopotasemia, deshidratación
	Trastornos psiquiátricos
Frecuentes	Insomnio
	Trastornos del sistema nervioso
Muy frecuentes	Disgeusia, cefalea
Frecuentes	Ageusia
	Trastornos cardíacos
Infrecuentes	Insuficiencia cardíaca congestiva



Tabla 2: Reacciones adversas observadas en los estudios oncológicos

 Trastornos vasculares	
Frecuentes	Hemorragia ^b , hipertensión arterial, linfedema
Infrecuentes	Trombosis venosa profunda
 Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos	
Muy frecuentes	Neumonitis ^c , epistaxis, tos
Frecuentes	Disnea
Infrecuentes	Hemoptisis, embolia pulmonar
Raras	Síndrome de dificultad respiratoria aguda
 Trastornos gastrointestinales	
Muy frecuentes	Estomatitis ^d , diarrea, náuseas
Frecuentes	Vómitos, boca seca, dolor abdominal, dolor bucal, dispepsia, disfagia



Tabla 2: Reacciones adversas observadas en los estudios oncológicos

 Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo	
Muy frecuentes	Erupción, prurito
Frecuentes	Piel seca, trastorno de las uñas, acné, eritema, síndrome palmoplantar ^e
Raras	Angioedema
 Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo	
Frecuentes	Artralgia
 Trastornos renales y urinarios	
Frecuentes	Proteinuria, insuficiencia renal
Infrecuentes	Diuresis diurna elevada, insuficiencia renal aguda
 Trastornos del aparato reproductor y de la mama	
Frecuentes	Menstruación irregular ^f
Infrecuentes	Amenorrea ^f



Tabla 2: Reacciones adversas observadas en los estudios oncológicos



Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración

Muy frecuentes	Fatiga, astenia, edema periférico
Frecuentes	Pirexia (fiebre), inflamación de mucosa
Infrecuentes	Dolor torácico no cardíaco, cicatrización alterada



Exploraciones complementarias

Muy frecuentes	Peso disminuido
Frecuentes	Aspartato aminotransferasa elevada, alanina aminotransferasa elevada, creatinina elevada en sangre

^a Comprende todas las reacciones categorizadas en la clase «Infecciones e infestaciones»: frecuentes: neumonía e infecciones urinarias; infrecuentes: bronquitis, herpes zóster, sepsis, abscesos y casos aislados de infecciones oportunistas (p. ej. aspergilosis, candidiasis y hepatitis B); raras: miocarditis viral.

^b Comprende diversas reacciones hemorrágicas en diferentes sitios no enumeradas por separado.

^c Comprende reacciones frecuentes: neumonitis, enfermedad pulmonar intersticial, infiltración pulmonar; y raras: alveolitis, hemorragia pulmonar alveolar y toxicidad pulmonar.

^d Comprende reacciones muy frecuentes: estomatitis; frecuentes: estomatitis aftosa, úlceras bucales y linguales; e infrecuentes: glositis, glosodinia.

^e Notificado como síndrome de eritrodisestesia palmoplantar.

^f La frecuencia se basa en el número de mujeres con edades comprendidas entre 10 y 55 años en el conjunto de datos de seguridad.





Anomalías de laboratorio de importancia clínica



En la base de datos de seguridad agrupados de los estudios de fase III con doble enmascaramiento, las anomalías de laboratorio clínicamente importantes que aparecieron por vez primera o empeoraron y cuya incidencia fue $\geq 1/10$ (muy frecuentes) fueron las siguientes, enumeradas por orden decreciente de frecuencia:

- Hematología: disminución de la hemoglobina, disminución de la cifra de linfocitos, disminución de la cifra de leucocitos, disminución de la cifra de plaquetas y disminución de la cifra de neutrófilos (o de todas ellas, en cuyo caso se registra como pancitopenia).
- Bioquímica clínica: aumento de la glucemia (en ayunas), aumento del colesterol, aumento de los triglicéridos, aumento de la AST, disminución de los fosfatos, aumento de la ALT, aumento de la creatinina, disminución del potasio y de la albúmina.


La mayoría de las anomalías observadas (con incidencia $\geq 1/100$) fueron leves (grado 1) o moderadas (grado 2).

Las anomalías hematológicas y bioquímicas de grado 3 o 4 comprendieron:

- Hematología: disminución de la cifra de linfocitos, disminución de la hemoglobina (muy frecuentes); disminución de la cifra de neutrófilos, disminución de la cifra de plaquetas, disminución de la cifra de leucocitos (todas frecuentes).
- Bioquímica clínica: aumento de la glucemia en ayunas (muy frecuente); disminución de los fosfatos, disminución del potasio, aumento de la AST, aumento de la ALT, aumento de la creatinina, aumento del colesterol (total), aumento de los triglicéridos, descenso de la albúmina (todas frecuentes).



Complejo de esclerosis tuberosa (CET): resumen del perfil toxicológico



La información sobre las reacciones adversas se basa en los datos agrupados de los pacientes con CET que recibieron Afinitor (N = 612; de ellos, 409 pacientes menores de 18 años) en tres ensayos de fase III aleatorizados, con doble enmascaramiento y comparativos con placebo, que constaron de un período de tratamiento enmascarado y de un período sin enmascaramiento, y en un estudio de fase II no aleatorizado, sin enmascaramiento y con un solo grupo, los cuales sirvieron para fundamentar las indicaciones enumeradas (véanse la Tabla 3 y el apartado INDICACIONES).

Tabla 3: Estudios realizados con Afinitor en CET incluidos en la base de datos conjuntos de seguridad

Nombre del estudio Indicación	CRAD001C2485 ^a CET asociado a ASCG	EXIST-1 (M2301) CET asociado a ASCG	EXIST-2 (M2302) CET asociado a angiomiolipoma renal	EXIST-3 (M2304) CET asociado a epilepsia
Total de pacientes que recibieron everólimus	28	111 ^b	112 ^b	361 ^c
Duración mediana de la exposición, en meses (intervalo)	67,8 (4,7; 83,2)	47,1 (1,9; 58,3)	46,9 (0,5; 63,9)	30,4 (0,5; 48,8)
Exposición (expresada en años -paciente)	146	391	391	833
^a Ensayo sin enmascaramiento y con un solo grupo, sin grupo comparativo o de control.				
^b Número total de pacientes que recibieron everólimus durante las fases de extensión con doble enmascaramiento y sin enmascaramiento, incluidos los pacientes del grupo del placebo que pasaron a recibir tratamiento con everólimus.				
^c Cantidad total de pacientes tratados con everólimus en las fases principal, de extensión y posterior a la extensión, incluidos los pacientes del grupo del placebo que pasaron a recibir tratamiento con everólimus.				





Las reacciones adversas más frecuentes (con una incidencia $\geq 1/10$) considerando la base de datos conjuntos de seguridad fueron (en orden decreciente de frecuencia): estomatitis, pirexia (fiebre), rinofaringitis, diarrea, infecciones de las vías respiratorias superiores, vómitos, tos, erupción, cefalea, amenorrea, acné, neumonía, infección urinaria, sinusitis, menstruación irregular, faringitis, disminución del apetito, fatiga, hipercolesterolemia e hipertensión. Las reacciones adversas de grado 3 o 4 más frecuentes (con una incidencia $\geq 1/100$ y $< 1/10$) fueron: neumonía, estomatitis, amenorrea, neutropenia, pirexia (fiebre), menstruación irregular, hipofosfatemia, diarrea y celulitis.

Resumen tabulado de las reacciones adversas observadas en los estudios clínicos en pacientes con CET



En la Tabla 4 se muestra la incidencia de reacciones adversas según la base de datos agrupados de los estudios clínicos en pacientes con CET que recibieron everólimus (que comprende tanto los estudios con doble enmascaramiento como el estudio no enmascarado y los períodos de extensión), en los cuales la mediana de la duración de la exposición fue de 36,8 meses (con, aproximadamente, 47 meses en los estudios sobre CET asociado a ASCG y CET asociado a angiomiolipoma renal).

Las reacciones adversas se enumeran con arreglo a las clases principales de órganos, aparatos o sistemas del MedDRA. Las categorías de frecuencia se definen según la convención siguiente: muy frecuentes ($\geq 1/10$); frecuentes ($\geq 1/100$, $< 1/10$); infrecuentes ($\geq 1/1000$, $< 1/100$); raras ($\geq 1/10\ 000$, $< 1/1000$); muy raras ($< 1/10\ 000$); de frecuencia desconocida (imposible de estimar a partir de los datos disponibles). En cada categoría de frecuencia, las reacciones adversas se presentan por orden de frecuencia decreciente.



Tabla 4: Reacciones adversas observadas en los estudios clínicos en pacientes con CET



Infecciones e infestaciones

Muy frecuentes

Nasofaringitis, infección del tracto respiratorio superior, neumonía, infección del tracto urinario, sinusitis, faringitis

Frecuentes

Otitis media, celulitis, faringitis estreptocócica, gastroenteritis vírica, gingivitis

Infrecuentes

Herpes zóster, sepsis, bronquitis vírica



Trastornos de la sangre y del sistema linfático

Frecuentes

Anemia, neutropenia, leucopenia, trombocitopenia, linfopenia



Trastornos del sistema inmunitario

Frecuentes

Hipersensibilidad



Trastornos del metabolismo y de la nutrición

Muy frecuentes

Apetito disminuido, hipercolesterolemia

Frecuentes

Hipertrigliceridemia, hiperlipidemia, hipofosfatemia, hiperglucemia



Trastornos psiquiátricos

Frecuentes

Insomnio, agresividad, irritabilidad



Tabla 4: Reacciones adversas observadas en los estudios clínicos en pacientes con CET

 Trastornos del sistema nervioso	
Muy frecuentes	Cefalea
Infrecuentes	Disgeusia
 Trastornos vasculares	
Muy frecuentes	Hipertensión arterial
Frecuentes	Linfedema
 Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos	
Muy frecuentes	Tos
Frecuentes	Epistaxis, neumonitis
 Trastornos gastrointestinales	
Muy frecuente	Estomatitis ^a , diarrea, vómitos
Frecuentes	Estreñimiento, náuseas, dolor abdominal, flatulencia, dolor bucal, gastritis



Tabla 4: Reacciones adversas observadas en los estudios clínicos en pacientes con CET



Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo

Muy frecuentes	Erupción ^b , acné
Frecuentes	Piel seca, dermatitis acneiforme
Infrecuentes	Angioedema



Trastornos renales y urinarios

Frecuentes	Proteinuria
------------	-------------



Trastornos del aparato reproductor y de la mama

Muy frecuentes	Amenorrea ^c , menstruación irregular ^c
Frecuentes	Menorragia ^a , quiste ovárico, hemorragia vaginal
Infrecuentes	Regla retrasada (retraso de la menstruación) ^c



Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración

Muy frecuentes	Pirexia (fiebre), fatiga
----------------	--------------------------



Exploraciones complementarias

Muy frecuentes	Lactato-deshidrogenasa (LDH) elevada en sangre, lutropina (LH) elevada en sangre
Infrecuentes	Folitropina (FH) elevada en sangre

^a Comprende reacciones muy frecuentes: estomatitis, úlceras bucales, aftas; frecuentes: úlceras labiales y úlceras linguales; infrecuentes: dolor gingival, glositis. ^b Comprende reacciones muy frecuentes: erupción; frecuentes: erupción eritematosa, eritema; infrecuentes: erupción generalizada, erupción maculopapular, erupción macular. ^c La frecuencia se basa en el número de mujeres con edades comprendidas entre 10 y 55 años en el conjunto de datos de seguridad.



Anomalías de laboratorio de importancia clínica



En la base de datos de seguridad agrupados de los estudios en pacientes con CET, las anomalías de laboratorio clínicamente importantes que aparecieron por vez primera o empeoraron y cuya incidencia fue $\geq 1/10$ (muy frecuentes) fueron las siguientes, enumeradas por orden decreciente de frecuencia:


- Hematología: aumento del tiempo de tromboplastina parcial, disminución de la cifra de neutrófilos, disminución de la hemoglobina, disminución de la cifra de leucocitos, disminución de la cifra de plaquetas y disminución de la cifra de linfocitos.
- Bioquímica clínica: aumento del colesterol, aumento de los triglicéridos, aumento de la AST, aumento de la ALT, disminución de los fosfatos, aumento de la fosfatasa alcalina y aumento de la glucemia (en ayunas).

La mayoría de las anomalías de laboratorio fueron leves (grado 1) o moderadas (grado 2). Las anomalías hematológicas y bioquímicas de grado 3 o 4 comprendieron:

- Hematología: disminución de la cifra de neutrófilos, aumento del tiempo de tromboplastina parcial, disminución de la cifra de hemoglobina (frecuentes); disminución de la cifra de linfocitos, de plaquetas y de leucocitos (infrecuentes).
- Bioquímica clínica: disminución de los fosfatos, aumento de los triglicéridos, aumento de la fosfatasa alcalina, aumento de la ALT, aumento de la AST, aumento del colesterol (frecuentes); y aumento de la glucemia en ayunas (infrecuentes).



Reacciones adversas (de frecuencia desconocida) procedentes de comunicaciones espontáneas de casos y de casos publicados



Desde la comercialización de Afinitor, se han registrado las siguientes reacciones adversas a través de comunicaciones espontáneas de casos y de casos publicados en la literatura específica. Dado que esas reacciones provienen de notificaciones espontáneas de una población de tamaño incierto, no es posible calcular de forma fiable su frecuencia, por lo que se las clasifica como reacciones adversas de frecuencia desconocida. Las reacciones adversas se enumeran según la clase de órgano, aparato o sistema del MedDRA. En cada clase de órgano, aparato o sistema, las reacciones adversas se presentan en orden decreciente de gravedad.

Tabla 5: Reacciones adversas (de frecuencia desconocida) procedentes de comunicaciones espontáneas de casos y de casos publicados en oncología y CET

Lesiones traumáticas, intoxicaciones y complicaciones de procedimientos terapéuticos
Síndrome de hipersensibilización por irradiación

Descripción de algunas de las reacciones adversas



En los estudios clínicos y las notificaciones espontáneas recibidas desde la comercialización del medicamento, el everólimus se ha asociado a casos graves de reactivación de la hepatitis B, algunos de ellos mortales. Cabe prever que se produzca una reactivación de las infecciones durante los períodos de inmunodepresión (véase el apartado ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES).

En los estudios clínicos y las notificaciones espontáneas recibidas desde la comercialización del medicamento, el everólimus se ha asociado a casos de insuficiencia renal (algunos con desenlace mortal) y proteinuria. Se recomienda vigilar la función renal (véase el apartado ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES).



En los estudios clínicos y las notificaciones espontáneas recibidas desde la comercialización del medicamento, el everólimus se ha asociado a casos de amenorrea (incluida la amenorrea secundaria).

En los estudios clínicos y las notificaciones espontáneas recibidas desde la comercialización del medicamento, el everólimus se ha asociado a casos de neumonía por *P. jirovecii*, algunos de los cuales han resultado mortales (véase el apartado ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES).

En los estudios clínicos y las notificaciones espontáneas recibidas desde la comercialización del medicamento se han descrito casos de angioedema, con o sin administración simultánea de un IECA (véase el apartado ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES).

En un estudio de fase IV, de un solo grupo, realizado en mujeres posmenopáusicas con cáncer de mama avanzado con positividad de receptores hormonales y negatividad del HER2 ($N = 92$), con el ánimo de reducir la incidencia y la severidad de la estomatitis se administró a las pacientes por vía tópica una solución oral de 0,5 mg/5 ml de dexametasona sin alcohol etílico (10 ml aplicados en forma de enjuague bucal durante 2 minutos, sin tragar el producto, cuatro veces al día durante 8 semanas) desde el comienzo del tratamiento con Afinitor (10 mg/día) y exemestano (25 mg/día). No debían ingerirse alimentos ni bebidas durante al menos la hora siguiente a haber escupido la solución oral de dexametasona después del enjuague.




Al cabo de 8 semanas, la incidencia de estomatitis de grado ≥ 2 fue del 2,4% ($n = 2/85$ pacientes evaluables), que es menor que la incidencia histórica (27,4%; $n = 132/482$) procedentes del estudio de fase III realizado en esta población clínica (BOLERO-2). La incidencia de estomatitis de grado 1 fue del 18,8% ($n = 16/85$) y no hubo casos de estomatitis de grado 3 o 4. El perfil toxicológico observado en este estudio coincidió en general con el ya determinado para el everólimus en los pacientes oncológicos y con CET, a excepción de la candidiasis oral, que se notificó en el 2,2% ($n = 2/92$) de las pacientes de este estudio y en el 0,2% ($n = 1/482$) de las pacientes del BOLERO-2.



Poblaciones especiales

Pacientes pediátricos (menores de 18 años)



El uso pediátrico de Afinitor en comprimidos y Afinitor en comprimidos dispersables está recomendado para pacientes con CET asociado a ASCG que no requieran tratamiento quirúrgico inmediato. No se han confirmado la seguridad ni la eficacia de Afinitor en comprimidos ni Afinitor en comprimidos dispersables en pacientes pediátricos con angiomiolipoma renal y CET ni en pacientes pediátricos con cáncer. La seguridad de Afinitor en pacientes pediátricos con CET asociado a ASCG se demostró en dos ensayos clínicos.

El tipo, la frecuencia y la severidad de las reacciones adversas fueron en general semejantes en todos los grupos de edad evaluados. La excepción fueron las infecciones, que se notificaron con más frecuencia y severidad en los pacientes menores de 6 años. Se presentaron infecciones de grado 3 o 4 en 49 de 137 pacientes (36%) de <6 años, en 53 de 272 pacientes (19%) de 6 a <18 años y en 27 de 203 pacientes (13%) de ≥ 18 años. Entre los 409 pacientes de <18 años tratados con everólimus se notificaron 2 casos mortales debidos a infecciones. Los resultados de los estudios clínicos no mostraron ningún efecto de Afinitor sobre el crecimiento ni el desarrollo puberal. En los pacientes de menor edad con CET y ASCG se observó una tendencia a una menor $C_{mín}$ normalizada respecto a la dosis (expresada en mg/m²). La mediana de la $C_{mín}$ normalizada respecto a la dosis expresada en mg/m² fue menor en los grupos de menor edad, lo que indica que la depuración del everólimus (normalizada respecto a la superficie corporal) era mayor en los pacientes más jóvenes (véase el apartado FARMACOLOGÍA CLÍNICA).

Pacientes geriátricos (mayores de 65 años)



En la base de datos de seguridad agrupados correspondiente a los estudios oncológicos, el 37% de los pacientes tratados con Afinitor tenían más de 65 años. El porcentaje de pacientes oncológicos que presentaron una RA que obligó a suspender definitivamente el tratamiento con Afinitor fue mayor entre los pacientes mayores de 65 años (20% frente al 13%). Las RA más frecuentes ($\geq 1/100$) que obligaron a suspender definitivamente el tratamiento fueron la neumonitis (incluida la enfermedad pulmonar intersticial), la estomatitis, la fatiga y la disnea.



INTERACCIONES



El everólimus es un sustrato de la CYP3A4 y también es un sustrato y un inhibidor moderado de la bomba de expulsión de fármacos conocida como glucoproteína P (gpP). Por consiguiente, la absorción y posterior eliminación del everólimus puede verse influida por fármacos que afecten a la CYP3A4, a la gpP o a ambas. *In vitro*, el everólimus es un inhibidor competitivo de la CYP3A4 y un inhibidor mixto de la CYP2D6.

Sustancias que pueden aumentar la concentración sanguínea de everólimus



Las sustancias que inhiben la actividad de la CYP3A4, y que por consiguiente reducen el metabolismo del everólimus, pueden aumentar las concentraciones sanguíneas de everólimus. Los inhibidores de la gpP, que pueden reducir la expulsión del everólimus de las células intestinales, pueden aumentar las concentraciones sanguíneas de everólimus.

Se debe evitar la administración simultánea de Afinitor con inhibidores potentes de la CYP3A4 o de la gpP (como el ketoconazol, el itraconazol, el ritonavir, la claritromicina y la telitromicina, entre otros).

Se apreció un significativo aumento de la exposición al everólimus (la $C_{máx}$ y el AUC fueron 3,9 y 15,0 veces mayores, respectivamente) en voluntarios sanos que habían recibido everólimus junto con ketoconazol (un inhibidor potente de la CYP3A4 y la gpP).

El tratamiento simultáneo con inhibidores moderados de la CYP3A4 (como la eritromicina, el verapamilo, la ciclosporina, el fluconazol, el diltiazem, el amprenavir, el fosamprenavir o el aprepitant, entre otros) e inhibidores de la gpP exige cautela. Es necesario disminuir la dosis de Afinitor si se administra junto con inhibidores moderados de la CYP3A4 o de la gpP (véanse los apartados POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN y ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES).



Se observó un aumento de la exposición al everólimus en voluntarios sanos que recibieron everólimus junto con:

- Eritromicina (inhibidor moderado de la CYP3A4 e inhibidor de la gpP; la $C_{máx}$ fue 2,0 veces mayor y el AUC, 4,4 veces mayor).
- Verapamilo (inhibidor moderado de la CYP3A4 e inhibidor de la gpP; la $C_{máx}$ fue 2,3 veces mayor y el AUC, 3,5 veces mayor).
- Ciclosporina (sustrato de la CYP3A4 e inhibidor de la gpP; la $C_{máx}$ fue 1,8 veces mayor y el AUC, 2,7 veces mayor).

Durante el tratamiento con Afinitor no se deben consumir pomelos (toronjas), jugo de pomelo, carambolas, naranjas amargas ni otros alimentos que puedan alterar la actividad de la gpP y del citocromo P450.



No se apreciaron diferencias en la $C_{mín}$ del everólimus después de un tratamiento con la dosis diaria de 10 mg o 5 mg en presencia o ausencia de sustratos de la CYP3A4 o de la gpP. La coadministración de inhibidores débiles de la CYP3A4, con o sin inhibidores de la gpP, no produjo efectos evidentes en la $C_{mín}$ del everólimus después de un tratamiento con la dosis diaria de 10 mg o 5 mg.

Sustancias que pueden reducir la concentración sanguínea de everólimus

Las sustancias inductoras de la CYP3A4 o de la gpP pueden reducir las concentraciones sanguíneas de everólimus mediante un aumento del metabolismo de este o de su expulsión de las células intestinales.

Se debe evitar la administración simultánea de Afinitor con inductores potentes de la CYP3A4 o de la gpP. Si debe administrarse Afinitor junto con un inductor potente de la CYP3A4 o de la gpP (como la rifampicina o la rifabutina), puede resultar necesario ajustar la dosis de Afinitor (véanse los apartados POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN y ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES).



La administración previa a voluntarios sanos de múltiples dosis de rifampicina (inductor potente de la CYP3A4 y de la gpP), en concreto, 600 mg diarios durante 8 días, seguidas de una dosis única de everólimus por vía oral, casi triplicó la depuración de este y redujo la $C_{m\acute{a}x}$ en un 58% y el AUC en un 63%.

Entre los inductores potentes de la CYP3A4, de la gpP o de ambas que pueden aumentar el metabolismo del everólimus y reducir sus concentraciones sanguíneas figuran también el hipérico o hierba de san Juan (*Hypericum perforatum*), anticonvulsivos como la carbamazepina, el fenobarbital o la fenitoína, y antirretrovíricos como el efavirenz y la nevirapina.

Sustancias cuya concentración plasmática puede verse alterada por el everólimus



Los estudios en voluntarios sanos indican que no existen interacciones farmacocinéticas de importancia clínica entre Afinitor y dos inhibidores de la HMG-CoA reductasa: la atorvastatina (un sustrato de la CYP3A4) y la pravastatina (que no es sustrato de la CYP3A4), y los análisis de farmacocinética poblacional tampoco arrojaron indicios de que la simvastatina (un sustrato de la CYP3A4) afecte a la depuración de Afinitor.

In vitro, el everólimus es un inhibidor competitivo del metabolismo de la ciclosporina (sustrato de la CYP3A4) y un inhibidor mixto del dextrometorfano (sustrato de la CYP2D6). Tras la administración de una dosis oral de 10 mg al día o 70 mg a la semana, la $C_{m\acute{a}x}$ media de everólimus en el estado de equilibrio es entre 12 y 36 veces menor que la K_i de la inhibición *in vitro*. Por consiguiente, no se considera probable que el everólimus afecte al metabolismo de los sustratos de la CYP3A4 y la CYP2D6.



Un estudio en voluntarios sanos demostró que la administración simultánea de una dosis oral de midazolam (sustrato de la CYP3A4) con everólimus aumentaba la $C_{\text{máx}}$ y el $AUC_{0-\infty}$ del midazolam en un 25% y un 30%, respectivamente, pero ni el cociente metabólico de $AUC_{0-\infty}$ (cociente entre el AUC del metabolito 1-hidroximidazolam y el AUC del midazolam) ni la vida media ($t_{1/2}$) terminal del midazolam se vieron afectados.

Esto sugiere que la mayor exposición al midazolam se debe a los efectos que el everólimus ejerce en el sistema gastrointestinal cuando ambos fármacos se toman al mismo tiempo. Por consiguiente, el everólimus puede afectar a la biodisponibilidad de los fármacos coadministrados por vía oral que son sustratos de la CYP3A4, pero no es probable que afecte a la biodisponibilidad de otros sustratos farmacéuticos de la CYP3A4 que se administran por vías distintas de la oral, como la intravenosa, subcutánea o transdérmica (véase el apartado ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES). El everólimus aumentó aproximadamente en un 10% las concentraciones predosis de carbamazepina y clobazam (sendos antiepilépticos) y de N-desmetilclobazam (un metabolito del clobazam).

El incremento en las concentraciones predosis de estos antiepilépticos puede no ser clínicamente significativo, y es posible plantearse un ajuste de la dosis en el caso de antiepilépticos con un margen terapéutico estrecho, como la carbamazepina. El everólimus no afectó a las concentraciones predosis de antiepilépticos que son sustratos de la CYP3A4 (clonazepam, diazepam, felbamato y zonisamida). El everólimus tampoco afectó a las concentraciones predosis de otros antiepilépticos como el ácido valproico, el topiramato, la oxcarbazepina, el fenobarbital, la fenitoína y la primidona.



La coadministración de everólimus y de octreotida de absorción lenta aumenta la $C_{\min}$ de la octreotida con un cociente de medias geométricas (everólimus/placebo) de 1,47 (IC del 90%: 1,32-1,64), que es improbable que afecte de forma clínicamente significativa la eficacia del everólimus en los pacientes con tumores neuroendocrinos avanzados.

La coadministración de everólimus y exemestano aumentó la $C_{\min}$ y la C_{2h} del exemestano en un 45% y 71%, respectivamente. Sin embargo, las concentraciones correspondientes de estradiol en el estado de equilibrio (a las 4 semanas) no diferían entre ambos grupos terapéuticos. No se observó un aumento de eventos adversos relacionados con el exemestano en las pacientes con cáncer de mama avanzado y positividad de receptores hormonales que recibieron esta combinación de fármacos. No es probable que el aumento de la concentración de exemestano repercuta en la eficacia ni la seguridad.

Vacunas



Los inmunodepresores pueden alterar la respuesta a las vacunas, por lo que estas pueden ser menos eficaces si se administran durante el tratamiento con Afinitor. Durante el tratamiento con Afinitor debe evitarse el uso de vacunas elaboradas con microorganismos vivos (véase el apartado ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES). Algunos ejemplos de ese tipo de vacunas son la antigripal intranasal, la antisarampionosa, la antiparotidítica, la antirrubeólica, la antipoliomielítica oral, la BCG (antituberculosa), la antiamarílica, la antivariólica y la antitifoidea elaborada con la cepa TY21a de *Salmonella typhi*.



EMBARAZO, LACTANCIA, MUJERES Y VARONES CON CAPACIDAD DE PROCREAR



Embarazo

Resumen de los riesgos



No se dispone de datos suficientes sobre el uso de Afinitor en mujeres embarazadas. Se desconoce el riesgo para el ser humano. Los estudios en animales han mostrado efectos tóxicos en la reproducción, entre ellos embriotoxicidad y fetotoxicidad. Afinitor no debe administrarse a mujeres embarazadas salvo que los posibles beneficios justifiquen el riesgo para el feto.

Datos en animales



La administración a ratas hembra de dosis orales de everólimus $\geq 0,1$ mg/kg (que corresponde aproximadamente al 4% del AUC_{0-24h} en los pacientes que reciben la dosis diaria de 10 mg) determinó una mayor incidencia de pérdidas embrionarias preimplantatorias. El everólimus atravesó la barrera placentaria y resultó tóxico para el producto de la concepción. En las ratas, el everólimus causó embriotoxicidad y fetotoxicidad con una exposición sistémica inferior al nivel terapéutico. Ello se reflejó en la mortalidad y el menor peso fetal.

Con dosis de 0,3 y 0,9 mg/kg se apreció una mayor incidencia de malformaciones y anomalías óseas (por ejemplo, hendidura esternal). En el conejo se observó embriotoxicidad en forma de un aumento de las resorciones tardías que se produjo con la dosis oral de 0,8 mg/kg (9,6 mg/m²). Con respecto a la superficie corporal, dicha dosis supone alrededor de 1,6 veces la dosis diaria de 10 mg recomendada para los adultos o la mediana de la dosis que recibieron los pacientes de ASCG, y 1,3 veces la mediana de la dosis que recibieron los pacientes con CET y epilepsia refractaria. En la rata, la administración del everólimus a machos no se tradujo en efectos adversos de tipo embriofetal.

Datos en humanos



Se han comunicado casos de exposición al everólimus durante la gestación, tanto a través de la madre como del padre (embarazo de la pareja de un varón tratado con everólimus). No se han notificado anomalías congénitas. En algunos casos, las gestaciones evolucionaron sin incidencias y nacieron bebés normales sanos.



Lactancia

Resumen de los riesgos



No se sabe si el everólimus pasa a la leche humana. No se han descrito casos de exposición al everólimus durante la lactancia en seres humanos. Sin embargo, en los estudios con ratas se observó que el everólimus y sus metabolitos pasaban fácilmente a la leche materna y alcanzaban una concentración 3,5 veces superior a la observada en el suero materno.

En consecuencia, las mujeres tratadas con Afinitor no deben amamantar durante el tratamiento ni en las 2 semanas posteriores a la última dosis.

Mujeres y varones con capacidad de procrear

Anticoncepción



A las mujeres con capacidad para procrear se les deberá informar de que los estudios con animales indican que Afinitor es perjudicial para el feto. Las mujeres con vida sexual activa y capacidad para procrear deben usar un método anticonceptivo eficaz (es decir, uno que se traduzca en una tasa anual de embarazos de $<1\%$ cuando se usa correctamente) mientras estén recibiendo Afinitor y en las 8 semanas posteriores a la finalización del tratamiento.

No se debe prohibir a los varones que estén tomando Afinitor que traten de tener descendencia (véase el apartado DATOS SOBRE TOXICIDAD PRECLÍNICA).



Esterilidad

Ambos sexos - Datos en animales



En los estudios de la función reproductiva en animales, la fertilidad de las hembras no se vio afectada, aunque se observaron pérdidas preimplantacionales. En ratas macho se apreció una alteración de la morfología testicular con dosis de 0,5 mg/kg o mayores, mientras que con la dosis de 5 mg/kg se observó una disminución de la motilidad de los espermatozoides, del número de cabezas de espermatozoides y de la concentración plasmática de testosterona.

Los valores citados se sitúan dentro del intervalo de exposición terapéutica (52 ng·h/ml y 414 ng·h/ml respectivamente, frente a la exposición de 560 ng·h/ml en seres humanos con la dosis de 10 mg/día) y provocaron una disminución de la fertilidad masculina. Hubo signos de reversibilidad.

Datos en humanos



El tratamiento con everólimus puede reducir la fertilidad masculina y femenina (véase el apartado DATOS SOBRE TOXICIDAD PRECLÍNICA). En pacientes tratadas con everólimus se han observado irregularidades menstruales, amenorrea secundaria y un desequilibrio asociado entre la lutropina u hormona luteinizante (LH) y la folitropina u hormona foliculoestimulante (FSH), mientras que en varones tratados con everólimus se han observado valores sanguíneos elevados de FSH y LH, valores sanguíneos disminuidos de testosterona y azoospermia.



SOBREDOSIS

En los estudios con animales, el poder de toxicidad aguda del everólimus fue bajo. No se observaron ni letalidad ni toxicidad severa en las ratas o ratones que recibieron dosis orales únicas de 2000 mg/kg (ensayo límite).

Son muy pocos los casos de sobredosis notificados en los seres humanos. Se han administrado dosis únicas de hasta 70 mg con una tolerabilidad aguda aceptable.

En cualquier caso de sobredosis deben instaurarse medidas complementarias generales de apoyo.



FARMACOLOGÍA CLÍNICA



Modo de acción



El everólimus es un inhibidor que actúa sobre mTOR (blanco de la rapamicina en los mamíferos) o, más concretamente, sobre mTORC1 (complejo 1 del blanco de la rapamicina en los mamíferos). Ejerce su actividad a través de la proteína receptora intracelular FKBP12, con la que interactúa con alta afinidad. El complejo formado por FKBP12 y everólimus se une a mTORC1 e inhibe la capacidad de este último para transducir señales. mTOR es una serina/treonina-cinasa clave que desempeña una función esencial en la regulación del desarrollo, la proliferación y la supervivencia celulares.

La regulación de la transducción de señales a través de mTORC1 es compleja, pues está modulada por mitógenos y factores de crecimiento y por la disponibilidad de energía y de nutrientes. mTORC1 es un regulador esencial de la síntesis general de proteínas en las últimas etapas de la vía de PI3K/AKT, cuya regulación presenta trastornos en la mayoría de las neoplasias malignas humanas, así como en enfermedades genéticas como el CET. La transducción de señales a través de mTORC1 se efectúa por medio de la modulación de la fosforilación de efectores consecutivos, cuyos componentes mejor caracterizados son los reguladores de la traducción S6K1 (cinasa 1 de la proteína ribosómica S6) y 4E-BP1 (proteína de fijación al factor de iniciación 4E en los eucariontes). La perturbación de la función de S6K1 y de 4E-BP1, como resultado de la inhibición de mTORC1, interfiere la traducción de los ARNm de proteínas que son esenciales para la regulación del ciclo celular, la glucólisis y la adaptación a las condiciones de hipoxia. Ello inhibe el desarrollo del tumor y la expresión de factores inducibles en condiciones de hipoxia (como los factores de transcripción HIF-1); la inhibición de tales factores reduce la expresión de otros factores implicados en la potenciación de los procesos angiogénicos tumorales (como el factor de crecimiento del endotelio vascular, VEGF) en varios tumores como el CCR y el angiomiolipoma. Dos de los principales reguladores de la transducción de señales a través de mTORC1 son los supresores tumorales TSC1 (hamartina, cuyo déficit es la causa de la esclerosis tuberosa de tipo 1) y TSC2 (tuberina, cuyo déficit es la causa de la esclerosis tuberosa de tipo 2), que interactúan entre sí y forman un complejo. La pérdida o la inactivación de TSC1 o de TSC2 dan lugar a altas concentraciones de Rheb-GTP, una GTPasa de la familia RAS, que interactúa con el complejo mTORC1 para activarlo.



La activación de mTORC1 pone en marcha una cascada de transducción de señales mediada por cinasas que incluye la activación de la S6K1. La S6K1, que es un sustrato del complejo 1 de mTOR (mTORC1), fosforila el receptor de estrógenos, lo que lleva a la activación ligando-independiente del receptor.

El everólimus es un inhibidor potente del desarrollo y la proliferación de células tumorales, células endoteliales, fibroblastos y células musculares lisas de los vasos sanguíneos. Se ha observado que reduce la proliferación de células tumorales, la glucólisis y la angiogénesis en los tumores sólidos *in vivo*, en consonancia con el papel regulador central que cumple mTORC1, por lo que ofrece dos modos independientes de inhibición del crecimiento tumoral: una actividad directa contra las células tumorales y una inhibición del estroma tumoral. En el cáncer de mama, la activación de la vía de mTOR representa un cambio adaptativo fundamental que impulsa la resistencia a la hormonoterapia. Se activan diversas vías de transducción de señales para evitar los efectos de dicha terapia. Una de esas vías es la PI3K/AKT/mTOR, que está activada de forma constitutiva en las células de cáncer de mama con carencia prolongada de estrógenos y resistencia a los inhibidores de la aromatasa. Los estudios *in vitro* muestran que las células de cáncer de mama dependientes de estrógenos y positivas respecto a HER2 son sensibles a los efectos inhibidores del everólimus, y que la politerapia con everólimus e inhibidores de la aromatasa potencia sinérgicamente los efectos antineoplásicos del everólimus. En las células de cáncer de mama, la resistencia a los inhibidores de la aromatasa debida a la activación de la AKT puede revertirse mediante la coadministración de everólimus. En el síndrome de esclerosis tuberosa —un trastorno genético—, unas mutaciones que inactivan el gen TSC1 o TSC2 provocan la aparición de hamartomas en todo el organismo. mTOR regula la síntesis proteínica y múltiples funciones celulares de etapas posteriores que pueden afectar a la excitabilidad neuronal y a la epileptogénesis. La sobreactivación de mTOR da lugar a displasia neuronal, aberraciones en la axonogénesis y la formación de dendritas, aumento de las corrientes sinápticas de excitación, disminución de la mielinización y trastornos de la estructura laminar cortical, lo que causa anomalías en el desarrollo y funcionamiento de las neuronas. Los estudios preclínicos en modelos de trastornos de la regulación de mTOR en el cerebro han demostrado que el tratamiento con un inhibidor de mTOR como el everólimus podría prolongar la supervivencia, suprimir las convulsiones, prevenir la aparición de nuevas convulsiones y prevenir la muerte prematura. En resumen, el everólimus es muy activo en este modelo neuronal del CET, con efectos beneficiosos atribuibles aparentemente a los efectos de inhibición del mTORC1.



Farmacodinámica



Tras la administración diaria de 5 o 10 mg de everólimus, se observó una moderada correlación entre la disminución de la fosforilación de 4E-BP1 (P4E-BP1) en el tejido tumoral y la $C_{\min}$ sanguínea media de dicho fármaco en el estado de equilibrio. Datos adicionales indican que la inhibición de la fosforilación de la cinasa S6 es muy sensible a la inhibición de mTOR por parte del everólimus. La inhibición de la fosforilación de eIF-4G fue completa para todos los valores de concentración mínima ($C_{\min}$) alcanzados tras la administración diaria de una dosis de 10 mg.

La supervivencia sin progresión tendía a prolongarse conforme aumentaba la $C_{\min}$ de everólimus normalizada con respecto al tiempo (definida como el cociente [área bajo la curva de $C_{\min}$ en función del tiempo desde el comienzo del estudio hasta el evento]/[tiempo transcurrido desde el comienzo del estudio hasta el evento]) en los pacientes con tumores neuroendocrinos pancreáticos (TNEp) avanzados (riesgo relativo: 0,73; IC del 95%: 0,50-1,08) y en los pacientes con tumores carcinoides avanzados (riesgo relativo: 0,66; IC del 95%: 0,40-1,08). La $C_{\min}$ de everólimus afectó a la probabilidad de reducción del tamaño del tumor ($p < 0,001$), con cocientes de posibilidades (*odds ratios*) de 1,62 y 1,46, respectivamente, cuando se modificó la exposición de 5 ng/ml a 10 ng/ml en pacientes con TNEp avanzado y en pacientes con tumor carcinóide avanzado.

En los pacientes con CET asociado a ASCG, un análisis basado en un modelo indicó que cuando se aumentaba al doble la $C_{\min}$, el tamaño del tumor se reducía un 13% (IC del 95%: -18,2% a -7,5%) respecto al inicial, lo que era estadísticamente significativo con un nivel de significación del 5%.



Farmacocinética

Absorción



Cuando se administra Afinitor en comprimidos a pacientes con tumores sólidos avanzados, la concentración máxima de everolimus se alcanza entre 1 y 2 horas después de una dosis oral de entre 5 y 70 mg administrada en ayunas o con un refrigerio ligero sin grasas. La $C_{\text{máx}}$ es proporcional a la dosis cuando se administra una dosis diaria de entre 5 y 10 mg. Con dosis únicas de 20 mg y superiores, la $C_{\text{máx}}$ presenta un aumento menor que el proporcional a la dosis, si bien el AUC se mantiene proporcional a la dosis en el intervalo de 5 a 70 mg.

Efecto de los alimentos

En los sujetos sanos, las comidas ricas en grasas redujeron la exposición sistémica a Afinitor en comprimidos (10 mg) (valorada según el AUC) en un 22% y la concentración plasmática máxima ($C_{\text{máx}}$) en un 54%; las comidas que contenían pocas grasas redujeron el AUC en un 32% y la $C_{\text{máx}}$ en un 42%.

En voluntarios sanos a los que se administró una sola dosis de 9 mg (3×3 mg) de Afinitor en comprimidos dispersables, las comidas ricas en grasas redujeron el AUC en un 11,7% y la $C_{\text{máx}}$ en un 59,8%, mientras que las comidas con pocas grasas redujeron el AUC en un 29,5% y la $C_{\text{máx}}$ en un 50,2%. Sin embargo, los alimentos no tuvieron ningún efecto aparente sobre la curva de concentraciones en función del tiempo en la fase posterior a la absorción 24 horas después de la administración de cualquiera de esas formas farmacéuticas.



Biodisponibilidad relativa de los comprimidos dispersables

Cuando Afinitor en comprimidos dispersables se administra como suspensión en agua, el $AUC_{0-\infty}$ es equivalente a la de Afinitor en comprimidos. Las concentraciones mínimas previstas de everólimus en el estado de equilibrio tras la administración diaria eran similares para ambas formas farmacéuticas. Sin embargo, con Afinitor en comprimidos dispersables, la $C_{máx}$ de everólimus era algo más baja (entre un 64% y un 80% de la registrada con Afinitor en comprimidos).

Distribución



El cociente sangre/plasma del everólimus, que depende de la concentración en el intervalo de 5 a 5000 ng/ml, varía entre el 17% y el 73%. La cantidad de everólimus confinada al compartimento plasmático es de alrededor del 20% para las concentraciones sanguíneas observadas en los pacientes oncológicos que toman Afinitor en dosis de 10 mg/día. La unión a proteínas plasmáticas es de alrededor del 74%, tanto en individuos sanos como en individuos con disfunción hepática moderada.

En ratas usadas como modelo, el everólimus administrado por vía intravenosa cruzó la barrera hematoencefálica de forma dependiente de la dosis, pero no proporcional a ella, lo que sugiere la saturación de una bomba de expulsión en dicha barrera. La penetración encefálica del everólimus se pudo comprobar asimismo en ratas que habían recibido dosis orales de everólimus.



Biotransformación y metabolismo



El everólimus es un sustrato de la CYP3A4 y de la gpP. Luego de la administración oral, es el componente circulante principal en la sangre humana. Se han detectado seis metabolitos importantes del everólimus en la sangre humana: tres metabolitos monohidroxilados, dos productos con anillos abiertos por hidrólisis y un conjugado fosfatidilcolínico del everólimus. Estos metabolitos se identificaron también en las especies animales de los estudios de toxicidad, y su actividad era unas cien veces menor que la del everólimus. Por consiguiente, se considera que la mayor parte de la actividad farmacológica total del everólimus se debe al compuesto inalterado.

Eliminación



No se han efectuado estudios de eliminación específicos en pacientes oncológicos, pero se tienen datos correspondientes a pacientes sometidos a trasplantes. Tras la administración de una dosis única de everólimus radiomarcado asociado a ciclosporina, el 80% de la radioactividad se recuperó en las heces y el 5% en la orina. No se detectó el compuesto inalterado en la orina ni en las heces.

Farmacocinética en el estado de equilibrio



Tras la administración de Afinitor en comprimidos a pacientes con tumores sólidos avanzados, el AUC_{0-T} del estado de equilibrio fue proporcional a la dosis en el intervalo posológico de 5 a 10 mg con la pauta diaria. El estado de equilibrio se alcanzaba en un máximo de dos semanas. La $C_{máx}$ es proporcional a la dosis en el intervalo de 5 a 10 mg diarios. El $t_{máx}$ se sitúa entre 1 y 2 horas después de la administración de la dosis. En el estado de equilibrio y con una pauta diaria, se observó una correlación significativa entre el AUC_{0-T} y la concentración mínima anterior a la administración de la dosis siguiente. El promedio de la vida media de eliminación del everólimus es de 30 horas aproximadamente.



Poblaciones especiales

Disfunción hepática



Se evaluaron la seguridad, la tolerabilidad y la farmacocinética de Afinitor en dos estudios comparativos en los que se administraron dosis orales únicas de Afinitor en comprimidos a individuos con disfunción hepática e individuos con función hepática normal. En un estudio, el AUC media del everólimus en 8 individuos con insuficiencia hepática moderada (clase B de Child-Pugh) fue dos veces mayor que en 8 individuos con función hepática normal.

En un segundo estudio llevado a cabo en 34 individuos con diversos grados de disfunción hepática que se compararon con individuos con función hepática normal, los individuos con disfunción hepática leve (clase A de Child-Pugh), moderada (clase B de Child-Pugh) y severa (clase C de Child-Pugh) presentaron una exposición al fármaco (es decir, una $AUC_{0-\infty}$) 1,6, 3,3 y 3,6 veces mayor, respectivamente, que la de los individuos con función hepática normal. Las simulaciones de la farmacocinética tras dosis múltiples avalan las recomendaciones posológicas en los individuos con disfunción hepática basadas en la correspondiente clase de Child-Pugh.

Teniendo en cuenta un metaanálisis de los dos estudios, se recomienda ajustar la dosis en los pacientes con disfunción hepática (véanse los apartados ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES y POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN).


Disfunción renal



En un análisis farmacocinético poblacional de 170 pacientes con cáncer avanzado, no se detectó ningún efecto significativo de la depuración de creatinina (25 a 178 ml/min) sobre la depuración aparente (CL/F) de everólimus. En pacientes sometidos a un trasplante de riñón, la disfunción renal posterior al trasplante (depuración de creatinina comprendida entre 11 y 107 ml/min) no afectó a la farmacocinética del everólimus.



Pacientes pediátricos (menores de 18 años)



- Afinitor no está indicado en pacientes pediátricos con cáncer (véase el apartado POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN) ni en pacientes pediátricos con CET asociado a angiomiolipoma renal.
- En los pacientes con CET asociado a ASCG que recibían Afinitor en comprimidos, la $C_{\min}$ del everólimus era aproximadamente proporcional a la dosis dentro del intervalo posológico comprendido entre 1,35 mg/m² y 14,4 mg/m².
- En los pacientes con CET asociado a ASCG que recibían Afinitor en comprimidos, la media geométrica de la $C_{\min}$ del everólimus normalizada respecto a la dosis en mg/m² era más baja (en grado estadísticamente significativo) en los pacientes menores de 10 años y los pacientes con edades comprendidas entre los 10 y los 18 años que en los adultos (mayores de 18 años), lo que parece indicar que la depuración del everólimus es mayor en los pacientes más jóvenes.

Pacientes geriátricos (mayores de 65 años)



En un análisis farmacocinético poblacional de pacientes oncológicos no se detectó ningún efecto significativo de la edad (entre 27 y 85 años) sobre la depuración del fármaco oral (CL/F: entre 4,8 y 54,5 l/h).

Raza u origen étnico




La depuración (CL/F) de everólimus oral es semejante en los pacientes oncológicos japoneses y de raza blanca con función hepática similar. Según un análisis farmacocinético poblacional, la depuración (CL/F) del fármaco oral es un 20% mayor, en promedio, en los receptores de trasplante de raza negra.



ESTUDIOS CLÍNICOS



Cáncer de mama avanzado con positividad de receptores hormonales



En el estudio clínico multicéntrico de fase III BOLERO-2 (CRAD001Y2301), aleatorizado y con doble enmascaramiento, se comparó Afinitor + exemestano con placebo + exemestano en mujeres posmenopáusicas con cáncer de mama avanzado y positividad de receptores estrogénicos, sin amplificación del gen *HER-2/NEU*, con recidiva o progresión del tumor tras un tratamiento previo con letrozol o anastrozol.

El criterio de valoración principal del ensayo fue la supervivencia sin progresión (SSP) evaluada según los Criterios de evaluación de la respuesta aplicables a los tumores sólidos (RECIST), basándose en la evaluación realizada por los investigadores (evaluación local de los datos radiológicos). Los análisis complementarios de la SSP se basaron en una evaluación independiente y centralizada de los datos radiológicos. Los criterios de valoración secundarios fueron la supervivencia global (SG), la tasa global de respuesta (TGR), la tasa de beneficio clínico (TBC), la seguridad, el cambio de la calidad de vida (CCV) y el tiempo transcurrido hasta el deterioro de la puntuación en la escala funcional del ECOG. Otros criterios de valoración fueron las variaciones de los marcadores de recambio óseo al cabo de 6 y 12 semanas. En total, 724 pacientes fueron asignadas aleatoriamente (en una proporción 2:1) al grupo de la combinación de everólimus (10 mg al día) + exemestano (25 mg al día) ($n = 485$) o al del placebo + exemestano (25 mg al día) ($n = 239$). Ambos grupos terapéuticos estaban equilibrados con respecto a las características demográficas y nosológicas iniciales y los antecedentes de uso previo de antineoplásicos. La mediana de edad de las pacientes era de 61 años (intervalo de 28 a 93 años) y el 75% de ellas eran de raza blanca. La mediana de duración del tratamiento enmascarado fue de 24 semanas en las pacientes del grupo de Afinitor + exemestano y de 13,4 semanas en las del grupo del placebo más exemestano. Los resultados de eficacia provienen del análisis final de la SSP realizado tras observarse 510 eventos determinantes de la supervivencia según la evaluación local y 320 eventos determinantes de la supervivencia según la evaluación centralizada. Las pacientes del grupo del placebo + exemestano no cambiaron de grupo para recibir everólimus en el momento de la progresión. El estudio reveló un beneficio clínico estadísticamente significativo con la combinación de everólimus + exemestano en comparación con la del placebo + exemestano, que se tradujo en una mediana de SSP 2,5 veces mayor (véase la Tabla 6).



Tabla 6 BOLERO-2: resultados de eficacia

Análisis	Afinitor ^a N = 485	Placebo ^a N = 239	Cociente de riesgos instantáneos	Valor de p
Mediana de la supervivencia sin progresión, en meses (IC del 95%)				
Evaluación radiológica efectuada por el investigador	7,82 (6,93; 8,48)	3,19 (2,76; 4,14)	0,45 (0,38; 0,54)	<0,0001
Evaluación radiológica independiente	11,01 (9,66; 15,01)	4,14 (2,89; 5,55)	0,38 (0,31; 0,48)	<0,0001
Mejor respuesta global (%; IC del 95%)				
Tasa de respuesta objetiva (TRO) ^b	12,6% (9,8; 15,9)	1,7% (0,5; 4,2)	n/a ^d	<0,0001 ^e
Tasa de beneficio clínico (TBC) ^c	51,3% (46,8; 55,9)	26,4% (20,9; 32,4)	n/a ^d	<0,0001 ^e

^a En combinación con exemestano
^b Tasa de respuesta objetiva = proporción de pacientes con respuesta completa o parcial
^c Tasa de beneficio clínico = proporción de pacientes con respuesta completa, respuesta parcial o enfermedad estable ≥24 semanas
^d No corresponde
^e El valor de p se obtiene a partir de la prueba exacta de Cochran-Mantel-Haenszel utilizando una versión estratificada de la prueba de permutación de Cochran-Armitage





En el momento del análisis final de la SG, la mediana de la duración de la SG fue de 31 meses en el grupo que recibió la combinación de everólimus + exemestano frente a 26,6 meses en el grupo que recibió placebo + exemestano (CRI = 0,89 [IC del 95%: 0,73-1,10; p = 0,1426]) (véase la Figura 2).

Las tasas de SSP a los 12 meses fueron del 33% en las pacientes que recibieron everólimus + exemestano y del 11% en las pacientes del grupo del placebo + exemestano.

La reducción del tamaño del tumor también se constató en el 70,8% de los pacientes en el grupo de everólimus + exemestano respecto al 29,7% del grupo de placebo + exemestano.

No se observaron diferencias clínicas ni estadísticamente significativas entre ambos grupos terapéuticos en cuanto al tiempo transcurrido hasta el deterioro de la puntuación en la escala funcional del ECOG (≥ 1 punto) ni a la mediana del tiempo transcurrido hasta el deterioro ($\geq 5\%$) de las puntuaciones de los dominios del cuestionario QLQ-C30.




Efectos óseos

No se dispone de datos a largo plazo de los efectos del everólimus sobre el hueso. Los datos comparativos del estudio BOLERO-2 revelan una pronunciada mejora de los marcadores séricos del recambio óseo durante las primeras 12 semanas de tratamiento, que es indicativa de un efecto favorable sobre dicho recambio.



Tumores neuroendocrinos avanzados de origen gastrointestinal, pulmonar o pancreático



En el estudio multicéntrico de fase III RADIANT-3 (CRAD001C2324), aleatorizado y con doble enmascaramiento, se comparó Afinitor administrado junto con un tratamiento complementario óptimo (TCO) con respecto al placebo y el TCO en pacientes con tumores neuroendocrinos pancreáticos avanzados (TNEp). Este estudio demostró un beneficio clínico estadísticamente significativo de Afinitor en comparación con el placebo, que se reflejó en la prolongación de 2,4 veces de la mediana de la supervivencia sin progresión (SSP) (véase la Tabla 7).

El criterio de valoración principal del ensayo fue la SSP evaluada por los investigadores a partir de los datos radiológicos y aplicando los criterios RECIST (versión 1.0).

Los criterios de valoración secundarios fueron la seguridad, la TRO (RC + RP), la duración de la respuesta y la SG.

En total, se repartió aleatoriamente a 410 pacientes en dos grupos (en proporción 1:1) para recibir, respectivamente, Afinitor en dosis de 10 mg/día (n = 207) o bien un placebo (n = 203). Los datos demográficos estaban bien equilibrados (mediana de edad: 58 años; el 55% eran varones y el 78,5%, de raza blanca). La mediana de duración del tratamiento con enmascaramiento fue de 37,8 semanas en los pacientes que recibieron Afinitor y de 16,1 semanas en los del grupo del placebo.



Tabla 7 RADIANT-3: resultados de supervivencia sin progresión

Análisis	N	Afinitor N = 207	Placebo N = 203	CRI (IC del 95%)	Valor de <i>p</i> ^b
	410	Mediana de la supervivencia sin progresión, en meses (IC del 95%)			
Evaluación radiológica efectuada por el investigador		11,04 (8,41; 13,86)	4,60 (3,06; 5,39)	0,35 (0,27; 0,45)	<0,0001
Evaluación radiológica independiente ^a		11,40 (10,84; 14,75)	5,39 (4,34; 5,55)	0,34 (0,26; 0,44)	<0,0001

^a Incluye la validación (o arbitraje) debido a discrepancias entre la evaluación radiológica efectuada por el investigador y la evaluación radiológica central.

^b Valor de *p* unilateral derivado de una prueba de orden logarítmico (log-rank) estratificada.



Las tasas de SSP a los 18 meses fueron del 34,2% en el grupo de Afinitor y del 8,9% en el del placebo. Según la evaluación realizada por los investigadores, la tasa de respuesta objetiva fue del 4,8% en el grupo del everólimus, frente al 2,0% en el grupo del placebo. La reducción del tamaño del tumor también se constató en el 64,4% de los pacientes en el grupo de everólimus respecto al 20,6% del grupo de placebo.

En el momento del análisis final de la SG, la mediana de la duración de la SG fue de 44 meses en el grupo del everólimus frente a 37,7 meses en el grupo del placebo (CRI = 0,94 [IC del 95%: 0,73-1,20]; $p = 0,300$). En el grupo del placebo, 172 de los 203 pacientes (84,7%) comenzaron a recibir Afinitor sin enmascaramiento al comprobarse la progresión de la enfermedad, lo que puede haber introducido un factor de confusión en la detección de diferencias en la supervivencia global relacionadas con el tratamiento.

En el estudio multicéntrico de fase III RADIANT-4 (CRAD001T2302), aleatorizado y con doble enmascaramiento, se comparó Afinitor administrado junto con un tratamiento complementario óptimo (TCO) con respecto al placebo junto con un tratamiento complementario óptimo en pacientes con tumores neuroendocrinos (TNE) no funcionales avanzados de origen gastrointestinal o pulmonar sin antecedentes ni síntomas activos de síndrome carcinoide.

El criterio de valoración principal del estudio fue la supervivencia sin progresión (SSP) evaluada según los criterios RECIST modificados (versión 1.0), basándose en la evaluación independiente de los datos radiológicos. El análisis complementario de la SSP se basó en la evaluación local por los investigadores.

Los criterios de valoración secundarios fueron la SG, la TGR, la tasa de control de la enfermedad (TCE = proporción de pacientes con mejor respuesta global: respuesta completa, respuesta parcial o enfermedad estable), la seguridad, el cambio de la calidad de vida mediante el cuestionario FACT-G (Evaluación funcional del tratamiento del cáncer: General) y el tiempo transcurrido hasta el deterioro de la puntuación en la escala funcional de la OMS.



Se repartió aleatoriamente a 302 pacientes en dos grupos (en proporción 2:1) para recibir everólimus (10 mg al día) (n = 205) o el placebo (n = 97). La mediana de edad de los pacientes era de 63 años (intervalo de 22 a 86). El 76% de los pacientes eran de raza blanca. La mediana de la duración del tratamiento enmascarado fue de 40,4 semanas para los pacientes tratados con Afinitor y de 19,6 semanas para los pacientes que recibieron el placebo. Los pacientes del grupo del placebo no cambiaron de grupo para recibir everólimus en el momento de la progresión.

Los resultados de eficacia se obtuvieron a partir del análisis final de la SSP después de que en la evaluación radiológica independiente se observaran 178 eventos determinantes de la supervivencia.

El estudio demostró un beneficio clínico estadísticamente significativo del everólimus en comparación con el placebo, que se reflejó en una mediana de la SSP 2,8 veces mayor (véase la Tabla 8).



Tabla 8 RADIANT-4: resultados de supervivencia sin progresión

Análisis	N	Afinitor N = 205	Placebo N = 97	CRI (IC del 95%)	Valor de <i>p</i> ^a
	302	Mediana de la supervivencia sin progresión, en meses (IC del 95%)			
Evaluación radiológica independiente		11,01 (9,2; 13,3)	3,91 (3,6; 7,4)	0,48 (0,35; 0,67)	<0,0001
Evaluación radiológica efectuada por el investigador		13,96 (11,2; 17,7)	5,45 (3,7; 7,4)	0,39 (0,28; 0,54)	<0,0001

^a Valor de *p* unilateral derivado de una prueba de orden logarítmico (log-rank) estratificada





El beneficio general respecto de la SSP obtenido con Afinitor fue constante en todos los subgrupos de estratificación demográficos y pronósticos predefinidos (p. ej., tratamiento previo con análogos de la somatostatina, agrupación por origen del tumor y puntuación en la escala funcional de la OMS) y con un intervalo del cociente de riesgos instantáneos de entre 0,43 y 0,63. Un análisis retrospectivo de la SSP por subgrupos mostró un beneficio positivo respecto de la SSP para tumores de origen gastrointestinal (CRI = 0,60 [IC del 95%: 0,39 a 0,91]), de origen pulmonar (CRI = 0,50 [IC del 95%: 0,28 a 0,88]) y carcinomas de origen desconocido (CRI = 0,50 [IC del 95%: 0,22 a 1,16]).

La tasa global de respuesta según la evaluación independiente fue del 2% en el grupo tratado con everólimus frente al 1% en el grupo que recibió el placebo. La tasa de control de la enfermedad (respuesta completa, respuesta parcial o enfermedad estable) fue del 82,4% en el grupo tratado con everólimus frente al 64,9% en el grupo que recibió el placebo. La reducción del tamaño del tumor también se constató en el 63,6% de los pacientes del grupo de everólimus, frente al 25,9% de quienes recibieron el placebo.

El análisis final de la supervivencia global no demostró una diferencia estadísticamente significativa entre los pacientes que recibieron Afinitor o el placebo durante el período de tratamiento con enmascaramiento del estudio (CRI: 0,90 [IC del 95%: 0,66-1,24]).

No se observaron diferencias clínicas ni estadísticamente significativas entre ambos grupos en el tiempo transcurrido hasta el deterioro de la puntuación en la escala funcional de la OMS (CRI: 1,02 [IC del 95%: 0,65-1,61]) ni en el tiempo transcurrido hasta el deterioro de la puntuación total en el cuestionario FACT-G (CRI: 0,74 [IC del 95%: 0,50-1,10]).



En el estudio multicéntrico de fase III RADIANT-2 (CRAD001C2325), aleatorizado y con doble enmascaramiento, se comparó Afinitor administrado junto con octreotida de absorción lenta (Sandostatin LAR®) con respecto a un placebo administrado junto con la misma formulación de absorción lenta de octreotida en pacientes con tumores neuroendocrinos avanzados (tumores carcinoides), principalmente de origen gastrointestinal o pulmonar. El estudio puso de manifiesto un beneficio clínico de Afinitor en comparación con el placebo al aumentar en 5,1 meses la mediana de la SSP (véase la Tabla 9).

Pese a que en el análisis principal no se alcanzó la significación estadística (el límite de esta era un valor de $p = 0,0246$), los análisis adicionales en los que se hicieron ajustes para tener en cuenta la existencia de censura informativa y desequilibrios en ambos grupos terapéuticos revelaron un efecto terapéutico favorable al everólimus.

En el estudio RADIANT-2 participaron pacientes con tumores neuroendocrinos avanzados (tumores carcinoides), principalmente de origen gastrointestinal o pulmonar, que habían sufrido progresión tumoral en los 12 meses precedentes y tenían antecedentes de síntomas secretores. El 80,1% de los pacientes del grupo de Afinitor y el 77,9% de los pacientes del grupo del placebo habían recibido tratamiento con un análogo de la somatostatina antes de su ingreso al estudio. El criterio de valoración principal fue la SSP según los criterios RECIST en una evaluación independiente de los datos radiológicos.

Los criterios de valoración secundarios fueron la seguridad, la tasa de respuesta objetiva, la duración de la respuesta y la tasa de supervivencia global. Se repartió aleatoriamente a 429 pacientes en dos grupos (en proporción 1:1) para recibir Afinitor en dosis de 10 mg/día ($n = 216$) o el placebo ($n = 213$), además de 30 mg de octreotida de absorción lenta (Sandostatin LAR® intramuscular) cada 28 días. La mediana de duración del tratamiento con enmascaramiento fue de 37,0 semanas en los pacientes que recibieron Afinitor y de 36,6 semanas en los del grupo del placebo. Se apreciaron considerables desequilibrios en varios factores pronósticos importantes al inicio, que favorecían principalmente al grupo del placebo.



Tabla 9 RADIANT-2: resultados de supervivencia sin progresión

Análisis	N	Afinitor^a N = 216	Placebo^a N = 213	CRI (IC del 95%)	Valor de p^c
	429	Mediana de la supervivencia sin progresión, en meses (IC del 95%)			
Evaluación radiológica independiente ^b		16,43 (13,67; 21,19)	11,33 (8,44; 14,59)	0,77 (0,59; 1,00)	0,026
Evaluación radiológica efectuada por el investigador		11,99 (10,61; 16,13)	8,61 (8,08; 11,14)	0,78 (0,62; 0,98)	0,018

^a En combinación con octreotida de absorción lenta (Sandostatin LAR®).

^b Incluye la validación (o arbitraje) debido a discrepancias entre la evaluación radiológica efectuada por el investigador y la evaluación radiológica central.

^c Valor de *p* unilateral derivado de una prueba de orden logarítmico (log-rank) estratificada.



Los análisis adicionales de la evaluación independiente de los datos radiológicos en los que se hicieron ajustes para tener en cuenta la existencia de censura informativa y desequilibrios entre ambos grupos terapéuticos revelaron un efecto terapéutico favorable al everólimus. Los resultados de un análisis multivariable adicional en el que se corrigieron los desequilibrios existentes entre los grupos terapéuticos evidenciaron un CRI de 0,73 (IC del 95%: 0,56-0,97). El CRI estimado a partir del análisis con IPCW fue de 0,60 (IC del 95%: 0,44-0,84), favorable a Afinitor.

Las tasas de SSP a los 18 meses fueron del 47,2% con el tratamiento de everólimus + octreotida de absorción lenta (Sandostatin LAR®) y del 37,4% con el placebo + octreotida de absorción lenta (Sandostatin LAR®). Según la evaluación independiente de los datos radiológicos, la tasa de respuesta objetiva fue del 2,3% en el grupo del everólimus + octreotida de absorción lenta (Sandostatin LAR®), frente al 1,9% en el grupo del placebo + octreotida de absorción lenta (Sandostatin LAR®). Los resultados indican que el 75,0% de los pacientes del grupo del everólimus + octreotida de absorción lenta (Sandostatin LAR®) experimentaron una reducción del tamaño del tumor, frente al 44,8% en el grupo del placebo + octreotida de absorción lenta (Sandostatin LAR®).

El análisis final de la supervivencia global no mostró una diferencia estadísticamente significativa (CRI: 1,16; IC del 95%: 0,91-1,49). Se registraron 133 (61,6%) muertes en el grupo del everólimus + octreotida de absorción lenta y 120 (56,3%) en el del placebo + octreotida de absorción lenta. Como más del 58% de los pacientes del grupo del placebo se pasaron al grupo de tratamiento con Afinitor sin enmascaramiento al comprobarse la progresión de la enfermedad, es probable que el desequilibrio entre los grupos de tratamiento respecto al uso ulterior de octreotida y el desequilibrio inicial en los factores pronósticos principales dificultaran la detección de cualquier diferencia de la SG que guardara relación con el tratamiento. Cuando se ajustó en función de los factores pronósticos importantes, el CRI de la SG tendió a la unidad (CRI: 1,06; IC del 95%: 0,82-1,36).



Carcinoma de células renales avanzado



En el estudio internacional multicéntrico de fase III RECORD-1 (CRAD001C2240), aleatorizado y con doble enmascaramiento, se comparó Afinitor (10 mg/día) con placebo (combinados en ambos casos con un tratamiento complementario óptimo) en pacientes con carcinoma de células renales metastásico que presentaban progresión tumoral a pesar de haber recibido tratamiento con un VEGFR-TKI (inhibidor del dominio con actividad de tirosina-cinasa del receptor del factor de crecimiento del endotelio vascular), como sunitinib, sorafenib o ambos. También se admitieron pacientes que habían sido tratados anteriormente con bevacizumab e interferón α .

El criterio de valoración principal fue la supervivencia sin progresión, documentada según los criterios RECIST y determinada mediante una evaluación independiente, centralizada y enmascarada. Los criterios de valoración secundarios fueron la seguridad, la tasa de respuesta objetiva tumoral, la supervivencia global, los síntomas relacionados con la enfermedad y la calidad de vida. El Comité Independiente de Vigilancia de Datos (CIVD) recomendó la finalización de este ensayo en el momento de realizar el segundo análisis provisional por haberse satisfecho el criterio de valoración principal.

Se repartió aleatoriamente a 416 pacientes (en proporción 2:1) para recibir Afinitor (n = 277) o bien el placebo (n = 139). Las características demográficas estaban bien equilibradas (la mediana general de las edades era de 61 años [intervalo: 27-85 años], el 77% eran varones, el 88% eran de raza blanca y el 74% habían recibido anteriormente tratamiento con un VEGFR-TKI). La mediana de la duración del tratamiento enmascarado del estudio fue de 141 días en los pacientes que recibieron Afinitor y de 60 días en los del grupo del placebo.

Los resultados de un análisis provisional planificado indicaron que Afinitor era superior al placebo en cuanto al criterio principal de valoración (SSP), ya que lograba una reducción estadísticamente significativa del 67% en el riesgo de progresión o muerte (véase la Tabla 10).



Tabla 10 RECORD-1: resultados de supervivencia sin progresión

Población	N	Afinitor N = 277	Placebo N = 139	CRI (IC del 95%)	Valor de p
Mediana de la supervivencia sin progresión, en meses (IC del 95%)					
Análisis principal					
Todos los pacientes (evaluación independiente, centralizada y enmascarada)	416	4,9 (4,0; 5,5)	1,9 (1,8; 1,9)	0,33 (0,25; 0,43)	< 0,001 ^a
Análisis complementarios o de sensibilidad					
Todos los pacientes (evaluación local realizada por los investigadores)	416	5,5 (4,6; 5,8)	1,9 (1,8; 2,2)	0,32 (0,25; 0,41)	< 0,001 ^a
Puntuación pronóstica del MSKCC					
Riesgo reducido	120	5,8 (4,0; 7,4)	1,9 (1,9; 2,8)	0,31 (0,19; 0,50)	< 0,001 ^b
Riesgo moderado	235	4,5 (3,8; 5,5)	1,8 (1,8; 1,9)	0,32 (0,22; 0,44)	< 0,001 ^b
Riesgo elevado	61	3,6 (1,9; 4,6)	1,8 (1,8; 3,6)	0,44 (0,22; 0,85)	0,007 ^b
Tratamiento anterior con VEGFR-TKI					
Solamente sunitinib	184	3,9 (3,6; 5,6)	1,8 (1,8; 1,9)	0,34 (0,23; 0,51)	< 0,001 ^b
Solamente sorafenib	124	5,9 (4,9; 11,4)	2,8 (1,9; 3,6)	0,25 (0,16; 0,42)	< 0,001 ^b
Sunitinib y sorafenib	108	4,0 (3,6; 5,4)	1,8 (1,8; 2,0)	0,32 (0,19; 0,54)	< 0,001 ^b

^a Prueba del orden logarítmico (*log-rank*), estratificada según la puntuación pronóstica.


^b Prueba del orden logarítmico (*log-rank*) unilateral, no estratificada.



Las tasas de SSP a los seis meses fueron del 36% en el grupo de Afinitor y del 9% en el del placebo. Se observaron respuestas tumorales objetivas confirmadas en 5 pacientes (2%) del grupo de Afinitor y ninguno del grupo del placebo. Por lo tanto, el mejor resultado de la SSP corresponde fundamentalmente a pacientes con estabilización de la enfermedad (que representaron el 67% de las personas que recibieron Afinitor).

Los resultados finales de la SG mostraron una tendencia favorable a Afinitor, si bien la diferencia entre ambos grupos de tratamiento no fue estadísticamente significativa (CRI: 0,90, IC del 95%: 0,71-1,14; $p = 0,183$). En el grupo del placebo, 111 de los 139 pacientes (79,9%) pasaron a recibir Afinitor sin enmascaramiento tras comprobarse la progresión de la enfermedad, y ello puede haber dificultado la detección de cualquier diferencia en materia de supervivencia global que guardara relación con el tratamiento. La valoración de los síntomas relacionados con la enfermedad reveló una fuerte tendencia hacia una mejor calidad de vida en el grupo de Afinitor (CRI: 0,75; IC del 95%: 0,53-1,06; $p = 0,053$).

Complejo de esclerosis tuberosa (CET) asociado a angiomiolipoma renal



En el estudio multicéntrico de fase III EXIST-2 (CRAD001M2302), aleatorizado y con doble enmascaramiento, se comparó Afinitor con un placebo en pacientes con CET asociado a angiomiolipoma ($n = 113$) o con linfangioleiomiomatosis (LAM) esporádica asociada a un angiomiolipoma ($n = 5$). Se repartió aleatoriamente a los pacientes (en proporción 2:1) para recibir Afinitor en comprimidos o el correspondiente placebo. Para participar en el estudio se exigió la presencia de al menos un angiomiolipoma con diámetro máximo igual o superior a 3 cm, determinada mediante tomografía computadorizada o resonancia magnética (según la evaluación local de los datos radiológicos).



El criterio principal de eficacia fue la tasa de respuesta del angiomiolipoma según una evaluación centralizada e independiente de los datos radiológicos. El análisis se estratificó según el uso o no de antiepilépticos inductores de enzimas (AEIE) en el momento de la aleatorización. Los criterios de valoración secundarios más importantes fueron el tiempo transcurrido hasta la progresión del angiomiolipoma y la tasa de respuesta de las lesiones cutáneas. En total, se aleatorizaron 118 pacientes: 79 asignados al grupo que recibió 10 mg de Afinitor al día y 39 asignados al grupo del placebo. Ambos grupos terapéuticos estaban equilibrados en cuanto a las características demográficas y nosológicas iniciales y los antecedentes de tratamientos antiangiomiolipómicos. La mediana de la edad era de 31 años (intervalo: 18-61; el 46,6% tenían menos de 30 años en el momento de su inclusión en el estudio), el 33,9% eran varones y el 89,0% eran de raza blanca. De los pacientes incluidos en el estudio, el 83,1% presentaba angiomiolipomas ≥ 4 cm (el 28,8% presentaba angiomiolipomas ≥ 8 cm), el 78,0% presentaba angiomiolipomas bilaterales y el 39,0% había sido sometido a una nefrectomía o una embolización renal; el 96,6% tenía lesiones cutáneas al inicio y el 44,1% mostraba lesiones significativas de ASCG (es decir, tenía como mínimo un ASCG ≥ 1 cm de diámetro mayor).

La mediana de la duración del tratamiento enmascarado del estudio fue de 48,1 semanas (intervalo: 2-115) en los pacientes del grupo de Afinitor y de 45,0 semanas (intervalo: 9-115) en los que recibieron el placebo. Los resultados indicaron que Afinitor fue superior al placebo en cuanto al criterio principal de valoración, esto es, la mejor respuesta global del angiomiolipoma ($p < 0,0001$) (véase la Tabla 11).



Una vez que se reconoció que el tratamiento con everólimus era superior al placebo, se permitió que los pacientes inicialmente tratados con el placebo recibieran everólimus en caso de progresión del angiomiolipoma. En el momento del análisis final (4 años después de asignar aleatoriamente al último paciente), la mediana de la duración de la exposición al everólimus era de 204,1 semanas (intervalo: 2-278). Entre los pacientes tratados con everólimus durante el estudio no se notificó ningún caso de nefrectomía relacionada con un angiomiolipoma y solo se notificó un caso de embolización renal.



Tabla 11 EXIST-2: respuesta del angiomiolipoma

				Análisis principal ³		Valor de p	Análisis final ⁴
				Afinitor N = 79	Placebo N = 39		Afinitor N = 112
Tasa de respuesta del angiomiolipoma ^{1,2} , %				41,8	0	<0,0001	58,0
IC del 95%				(30,8; 53,4)	(0,0; 9,0)		(48,3; 67,3)
Mejor respuesta global del angiomiolipoma (%)							
Respuesta				41,8	0		58,0
Enfermedad estable				40,5	79,5		30,4
Progresión				1,3	5,1		0,9
No valorable				16,5	15,4		10,7

¹ Según la evaluación independiente y centralizada de los datos radiológicos.

² Las respuestas de los angiomiolipomas se confirmaron con una tomografía repetida. La respuesta se definió como: $\geq 50\%$ de reducción en la suma del volumen de los angiomiolipomas con respecto al inicio, más la ausencia de un nuevo angiomiolipoma con diámetro máximo $\geq 1,0$ cm, más ningún aumento del volumen renal $>20\%$ desde el nadir, más la ausencia de hemorragias de grado ≥ 2 vinculadas al angiomiolipoma.

³ Análisis principal del período con doble enmascaramiento.

⁴ En el análisis final se incluyen los pacientes procedentes del grupo de placebo; la mediana de duración de la exposición al everólimus fue de 204,1 semanas.



En el análisis principal, la reducción del volumen del angiomiolipoma se observó en el 95,5% de los pacientes del grupo de Afinitor frente al 59,4% de los pacientes del grupo del placebo. En el análisis final, la reducción del volumen del angiomiolipoma mejoró con el tratamiento prolongado con Afinitor. En las semanas 12, 96 y 192 se observaron reducciones de volumen del 30% o más en un 75,0% (78/104), un 80,6% (79/98) y un 85,2% (52/61) de los pacientes tratados, respectivamente. Análogamente, en esas mismas semanas se observaron reducciones de volumen del 50% o más en un 44,2% (46/104), un 63,3% (62/98) y un 68,9% (42/61) de los pacientes tratados, respectivamente

Afinitor se asoció a una prolongación clínicamente importante y estadísticamente significativa del tiempo transcurrido hasta la progresión del angiomiolipoma (CRI: 0,08; IC del 95%: 0,02-0,37; $p < 0,0001$) en el análisis principal.

La mediana del tiempo transcurrido hasta la progresión del angiomiolipoma fue de 11,4 meses en el grupo del placebo, y no se llegó a alcanzar en el de Afinitor. Se observó progresión en el 3,8% (3/79) de los pacientes del grupo de Afinitor, frente al 20,5% (8/39) de los del grupo del placebo.

Las tasas estimadas de supervivencia sin progresión a los 6 meses fueron del 98,4% en el grupo de Afinitor y del 83,4% en el del placebo. En el momento del análisis final aún no se había alcanzado la mediana del tiempo transcurrido hasta la progresión del angiomiolipoma. Se observó progresión del angiomiolipoma en el 14,3% de los pacientes (16/112). Las tasas de supervivencia sin progresión del angiomiolipoma estimadas a los 24 meses y a los 48 meses fueron del 91,6% (IC del 95%: 84,0%-95,7%) y 83,1% (IC del 95%: 73,4%-89,5%), respectivamente.



En el análisis principal, Afinitor también se asoció a mejoras clínica y estadísticamente significativas de la respuesta de las lesiones cutáneas ($p = 0,0002$), con tasas de respuesta del 26,0% (20/77) (IC del 95%: 16,6-37,2) en el grupo de Afinitor y del 0% (0/37) (IC del 95%: 0,0-9,5) en el grupo del placebo. En el análisis final, la tasa de respuesta de las lesiones cutáneas aumentó al 68,2% (73/107) (IC del 95%: 58,5%-76,9%), con un paciente que presentó una respuesta clínica completa confirmada y ningún paciente con enfermedad progresiva como mejor respuesta.

En un análisis exploratorio de pacientes con CET asociado a angiomiolipoma que también presentaban un ASCG, la tasa de respuesta del ASCG (proporción de pacientes con reducción $\geq 50\%$ del tamaño de las lesiones con respecto al tamaño inicial en ausencia de progresión) fue del 10,3% (4/39) en el grupo del everólimus en el análisis principal (frente a ninguna respuesta en los 13 pacientes con una lesión ASCG inicial que fueron aleatorizados al grupo del placebo) y aumentó al 48,0% (24/50) en el análisis final.

En el EXIST-2, 12 de los 16 pacientes evaluables para los cuales se determinó el volumen del angiomiolipoma hasta 1 año después de la interrupción del tratamiento con everólimus presentaron un aumento del volumen tumoral con respecto a la última determinación de dicho volumen efectuada antes de la interrupción, aunque el volumen del angiomiolipoma no fue mayor que el medido en la visita inicial. De esos 16 pacientes evaluables, 2 presentaron progresión angiomiolipómica —según la definición del protocolo— debido a hemorragia relacionada con el angiomiolipoma ($n = 1$) y aumento del volumen renal ($n = 1$). Estas observaciones indican que, en la mayoría de los pacientes, para lograr una reducción continuada y clínicamente significativa del volumen del angiomiolipoma es necesario no interrumpir el tratamiento.



CET asociado a ASCG

Estudio de fase III en pacientes con CET asociado a ASCG



En el estudio multicéntrico de fase III EXIST-1 (CRAD001M2301), aleatorizado y con doble enmascaramiento, se comparó Afinitor con un placebo en pacientes con CET asociado a ASCG, independientemente de la edad. Se repartió aleatoriamente a los pacientes (en proporción 2:1) para recibir Afinitor o el correspondiente placebo. Para participar en el estudio se exigió la presencia de al menos una lesión de ASCG $\geq 1,0$ cm en su diámetro mayor determinada mediante resonancia magnética (basada en la evaluación radiológica local).

Se exigieron, asimismo, pruebas radiológicas seriadas de crecimiento del ASCG, presencia de una nueva lesión de ASCG de ≥ 1 cm en su diámetro mayor, o la aparición de hidrocefalia o empeoramiento de la existente.

El criterio principal de valoración de la eficacia fue la tasa de respuesta del ASCG según una evaluación independiente y centralizada de los datos radiológicos. El análisis se estratificó según el uso o no de antiepilépticos inductores de enzimas (AEIE) en el momento de la aleatorización.

Los criterios de valoración secundarios más importantes, por orden jerárquico de prueba estadística, fueron los siguientes: variación absoluta de la frecuencia de episodios convulsivos de cualquier tipo, objetivados mediante EEG de 24 horas, entre el inicio y la semana 24; tiempo transcurrido hasta la progresión del ASCG; y tasa de respuesta de las lesiones cutáneas. La tasa de respuesta del angiomiolipoma se evaluó con carácter de análisis exploratorio.



En total, se repartió aleatoriamente a 117 pacientes para recibir Afinitor ($N = 78$) o el placebo ($N = 39$). Ambos grupos terapéuticos estaban equilibrados con respecto a las características demográficas y nosológicas iniciales y a los antecedentes de tratamientos previos contra el ASCG. La mediana de la edad era de 9,5 años (intervalo: 0,8-26,6; el 69,2% tenían más de 3 y menos de 18 años de edad en el momento de su inclusión en el estudio; el 17,1% tenían menos de 3 años en el momento de su inclusión en el estudio), el 57,3% eran varones y el 93,2% eran de raza blanca.

La mediana de la duración del tratamiento enmascarado del estudio fue de 52,2 semanas (intervalo: 24-89) en los pacientes del grupo de Afinitor y de 46,6 semanas (intervalo: 14-88) en los que recibieron el placebo.

Los resultados mostraron la superioridad de Afinitor sobre el placebo respecto al criterio de valoración principal, esto es, la mejor respuesta global del ASCG ($p < 0,0001$) (véase la Tabla 12).

En el momento del análisis final, la mediana de la duración de la exposición al everólimus en todos estos pacientes era de 204,9 semanas (intervalo: 8,1-253,7 semanas). La mejor respuesta global del ASCG había mejorado hasta un 57,7% (IC del 95%: 47,9-67,0) en el análisis final.

A lo largo de todo el estudio, ningún paciente tuvo que ser intervenido quirúrgicamente en relación con el ASCG.



Tabla 12 EXIST-1: respuesta del ASCG

	Análisis principal ³			Análisis final ⁴
	Afinitor N = 78	Placebo N = 39	Valor de p	Afinitor N = 111
Tasa de respuesta del ASCG^{1,2} (%)	34,6	0	<0,0001	57,7
IC del 95%	24,2; 46,2	0,0; 9,0		47,9; 67,0
Mejor respuesta global del ASCG (%)				
Respuesta	34,6	0		57,7
Enfermedad estable	62,8	92,3		39,6
Progresión	0	7,7		0
No valorable	2,6	0		2,7

¹ Según la evaluación independiente y centralizada de los datos radiológicos.

² La respuesta de los ASCG se confirmó mediante una tomografía repetida. La respuesta se definió como: reducción ≥50% de la suma del volumen del ASCG respecto al valor inicial, más ausencia de empeoramiento inequívoco de cualquier lesión de ASCG no significativa, más ausencia de un nuevo ASCG de ≥1 cm de diámetro mayor, más ausencia de hidrocefalia de nueva aparición o empeoramiento de la existente.

³ Análisis principal del período con doble enmascaramiento.

⁴ En el análisis final se incluyen los pacientes procedentes del grupo de placebo; la mediana de duración de la exposición al everólimus fue de 204,9 semanas.



En el análisis principal de la eficacia se observaron efectos terapéuticos concordantes en todos los subgrupos evaluados (p. ej., uso de AEIE frente a no uso de AEIE, sexo biológico y edad [<3 años, 3 a <18 años, y ≥ 18 años]) que variaban entre el 23% y el 52% de pacientes que respondieron en el grupo de Afinitor frente al 0% de pacientes en el grupo del placebo.

Durante el periodo con doble enmascaramiento, en las 12 primeras semanas de tratamiento con Afinitor ya se apreció una reducción del volumen del ASGC: el 29,7% de los pacientes (22 de 74) presentaban reducciones de volumen del 50% o más y el 73,0% (54 de 74), reducciones del 30% o más. En la semana 24 se observó un mantenimiento de esa reducción: el 41,9% de los pacientes (31 de 74) presentaban reducciones de volumen del 50% o más, y el 78,4% (58 de 74), reducciones del 30% o más.

En los pacientes del estudio tratados con everólimus (N = 111), que incluyen los procedentes del grupo del placebo, la respuesta tumoral (que comenzó a aparecer ya a las 12 semanas del tratamiento con everólimus) se mantuvo en evaluaciones posteriores. En las semanas 96 y 192 tras el comienzo del tratamiento con everólimus, la proporción de pacientes que alcanzaron una reducción de al menos un 50% en el volumen del ASGC fue del 45,9% (45 de 98) y del 62,1% (41 de 66), respectivamente. Por su parte, la proporción de pacientes que alcanzaron una reducción de al menos un 30% en el volumen del ASGC fue del 71,4% (70 de 98) y del 77,3% (51 de 66), respectivamente, en las semanas 96 y 192 tras el comienzo del tratamiento con everólimus.

El análisis del primer criterio secundario clave, a saber, la variación en la frecuencia de las convulsiones, no fue concluyente.



En ninguno de los grupos de tratamiento se alcanzó la mediana del tiempo transcurrido hasta la progresión del ASCG según la evaluación centralizada de los datos radiológicos. Solo se observó progresión de la enfermedad en el grupo del placebo (15,4%; valor de p no ajustado = 0,0002). Las tasas estimadas de supervivencia sin progresión a los 6 meses fueron del 100% en el grupo de Afinitor y del 85,7% en el del placebo.

El seguimiento prolongado de los pacientes asignados aleatoriamente al grupo del everólimus y de los que, procediendo del grupo del placebo, pasaron a recibir everólimus, mostró que las respuestas eran sostenidas en el tiempo. Se observaron beneficios clínicos adicionales de Afinitor, como reducciones en la gravedad de las lesiones cutáneas y en el tamaño del angiomiolipoma renal.

En el momento del análisis principal, Afinitor se asoció a mejoras clínicamente significativas de la respuesta de las lesiones cutáneas (valor de p no ajustado = 0,0004), con tasas de respuesta del 41,7% (IC del 95%: 30,2-53,9) en el grupo de Afinitor y del 10,5% (IC del 95%: 2,9-24,8) en el grupo del placebo. En el momento del análisis final, la tasa de respuesta de las lesiones cutáneas aumentó al 58,1% (IC del 95%: 48,1-67,7).

En el momento del análisis principal, solo se observaron respuestas del angiomiolipoma en el grupo del everólimus (n/N: 16/30; 53,3%; IC del 95%: 34,3-71,7). En el momento del análisis final, entre los 41 pacientes con CET asociado a ASCG que presentaban una o más lesiones de angiomiolipoma al inicio del tratamiento con everólimus, 30 pacientes (73,2%; IC del 95%: 57,1-85,8) lograron, como mejor respuesta global, al menos una reducción del 50% en la suma de los volúmenes de los angiomiolipomas. De los 37 pacientes con evaluaciones tumorales valorables del angiomiolipoma, 35 (94,6%) experimentaron como mejor variación porcentual una reducción respecto a la situación inicial en la suma de los volúmenes de los angiomiolipomas significativos. A lo largo de todo el estudio no se observaron nuevas lesiones de angiomiolipoma ni se notificaron episodios hemorrágicos de grado 2 o mayor.



DATOS SOBRE TOXICIDAD PRECLÍNICA



Se evaluó la toxicidad preclínica del everólimus en ratones, ratas, cerdos enanos, monos y conejos. Los órganos más afectados fueron los del aparato reproductor femenino y masculino en varias especies (degeneración tubular testicular, reducción de la cantidad de espermatozoides en los epidídimos y atrofia uterina); los pulmones en ratones y ratas (aumento de macrófagos alveolares), y los ojos solo en ratas (opacidades en la línea de sutura anterior del cristalino).

Se observaron alteraciones renales de menor importancia en las ratas (empeoramiento del depósito de lipofuscina en el epitelio tubular asociado a la edad, mayor frecuencia de hidronefrosis) y los ratones (agravamiento de las lesiones de fondo). No hubo signos de nefrotoxicidad en los monos ni en los cerdos enanos.

El everólimus parece agravar espontáneamente las enfermedades de fondo (miocarditis crónica en las ratas, infección en el plasma y el corazón por el virus de Cocksackie en los monos, coccidiosis del tubo digestivo en los cerdos enanos, lesiones cutáneas en los ratones y los monos). Estos efectos se observaron por lo general con una exposición sistémica que se ubicaba dentro del intervalo terapéutico o lo excedía, salvo en las ratas, en las que ocurrieron con una exposición inferior al intervalo terapéutico debido a la elevada distribución hística.




En los estudios de toxicidad en crías de rata con diferentes dosis, siendo la más baja de 0,15 mg/kg/d, las manifestaciones de toxicidad sistémica comprendieron la reducción de la ganancia ponderal y del consumo de alimentos, y el retraso en el logro de algunos hitos del desarrollo para todas las dosis; se observó una recuperación total o parcial tras suspender la administración. Con la posible excepción del efecto observado específicamente en el cristalino de las ratas (al que resultaron más sensibles las crías), parece que no existe una diferencia significativa entre las crías y los animales adultos en materia de sensibilidad a los efectos adversos del everólimus con dosis de entre 0,5 y 5 mg/kg al día. No se observaron signos de toxicidad relevantes en crías de mono con dosis de hasta 0,5 mg/kg/d durante 4 semanas.

Los estudios de genotoxicidad en los que se usaron criterios de genotoxicidad pertinentes no revelaron indicios de actividad clastógena ni mutágena. La administración de everólimus durante un período de hasta 2 años a ratones y ratas tampoco reveló indicios de poder cancerígeno, incluso cuando se utilizaron las dosis más elevadas que dieron lugar a una exposición 3,9 mayor o 0,2 veces menor, respectivamente, que la exposición clínica estimada para una dosis de 10 mg.

Toxicidad para la función reproductora



Para obtener información sobre la toxicidad para la función reproductora, véase el apartado EMBARAZO, LACTANCIA, MUJERES Y VARONES CON CAPACIDAD DE PROCREAR.



INCOMPATIBILIDADES

No procede.



CONSERVACIÓN

Véase la caja plegable.

Conservar en el envase original para protegerlo de la luz y la humedad.

Afinitor no debe usarse después de la fecha de caducidad («EXP») indicada en el envase.

Afinitor debe conservarse fuera del alcance y de la vista de los niños.



INSTRUCCIONES DE USO Y MANIPULACIÓN



Se desconoce el grado de absorción del everólimus a través de la exposición tópica. Por consiguiente, se aconseja a los cuidadores que eviten el contacto con las suspensiones de Afinitor en comprimidos o comprimidos dispersables. Lávese bien las manos antes y después de preparar cualquiera de estas suspensiones.



Preparación de la suspensión oral de Afinitor usando comprimidos dispersables

Información importante

- Tome AFINITOR en comprimidos dispersables solo como una suspensión. AFINITOR en comprimidos dispersables se prepara como una suspensión del medicamento no disuelto en agua y luego se toma por vía oral. No mastique ni triture ni trague los comprimidos dispersables enteros.
- Las personas que se ocupan de los pacientes deben evitar el contacto con las suspensiones de AFINITOR en comprimidos dispersables.
- Mantenga AFINITOR en comprimidos dispersables y la suspensión preparada fuera del alcance de los niños.
- Use solo agua (agua corriente o agua embotellada sin gas) para preparar la suspensión con AFINITOR en comprimidos dispersables. No prepare la suspensión con jugos u otros líquidos.
- La suspensión debe administrarse inmediatamente. Si no administra la dosis en los 60 minutos siguientes a su preparación, deséchela y prepare una nueva suspensión con AFINITOR en comprimidos dispersables.
- Antes de empezar a preparar la suspensión, reúna todo el material necesario para su preparación y administración. No utilice este material para ningún otro fin que la preparación y administración de la suspensión de AFINITOR en comprimidos dispersables.



Material necesario para preparar la suspensión en una jeringa para uso oral:



- Blíster de AFINITOR en comprimidos dispersables
- Tijeras para abrir el blíster
- Dos vasos limpios
- Aproximadamente 30 ml de agua
- Una jeringa para uso oral de 10 ml (desechable)

Material necesario para preparar la suspensión en un vaso pequeño:



- Blíster de AFINITOR en comprimidos dispersables
- Tijeras para abrir el blíster
- Un vaso dosificador de 30 ml para medir el volumen de agua (puede adquirirse en farmacias)
- Un vaso limpio (de 100 ml como máximo)
- Agua para preparar la suspensión
- Una cuchara para remover



Preparación de una dosis de suspensión de AFINITOR utilizando una jeringa para uso oral



1. Lávese y séquese las manos antes de preparar el medicamento.



2. Tome una jeringa para uso oral de 10 ml y tire del émbolo hacia atrás. Saque el émbolo del cuerpo de la jeringa.



3. Use unas tijeras para abrir el blíster por la línea de puntos. Retire del blíster el número de comprimidos dispersables prescritos. Introduzca inmediatamente los comprimidos dispersables (un máximo de 5 comprimidos de 2 mg, o 3 comprimidos de 3 mg, o 2 comprimidos de 5 mg) en la jeringa para uso oral.



4. Vuelva a meter el émbolo en el cuerpo de la jeringa para uso oral y presiónelo hasta que entre en contacto con los comprimidos dispersables.



5. Llene un vaso de agua e introduzca unos 5 ml de agua en la jeringa para uso oral tirando lentamente del émbolo hacia atrás.


Nota: La cantidad de agua en la jeringa no tiene que ser exacta. Todos los comprimidos dispersables deben estar cubiertos por agua. Si los comprimidos dispersables permanecen en la parte seca de la jeringa, golpee suavemente para que se desplacen hacia el agua.



6. Mantenga la jeringa para uso oral apuntando hacia arriba. Tire del émbolo hacia atrás para tomar unos 4 ml de aire.



7. Coloque la jeringa para uso oral llena en el vaso limpio vacío apuntando hacia arriba. Espere **3 minutos** para que los comprimidos dispersables se disgreguen. Asegúrese de dejar pasar 3 minutos y compruebe que los comprimidos dispersables se han disgregado por completo.



8. Invierta suavemente la jeringa para uso oral cinco veces inmediatamente justo antes de administrar la dosis. No sacuda la jeringa para uso oral.



9. Mantenga la jeringa para uso oral en posición vertical (con la punta mirando hacia arriba). Elimine con cuidado el exceso de aire empujando suavemente el émbolo.



10. Administre inmediatamente todo el contenido de la jeringa directamente en la boca del paciente lenta y cuidadosamente. No deje transcurrir más de 60 minutos tras la preparación.

11. Retire cuidadosamente la jeringa para uso oral de la boca del paciente.




12. Introduzca la punta de la jeringa para uso oral en el vaso con agua y tome unos 5 ml de agua en la jeringa para uso oral tirando lentamente del émbolo hacia atrás.



13. Mantenga la jeringa para uso oral apuntando hacia arriba y use el émbolo para tomar unos 4 ml de aire.



14. Con la jeringa en la misma posición, mueva en círculos el contenido de la jeringa para suspender las partículas residuales del medicamento.



15. Mientras tiene la jeringa para uso oral en posición vertical (con la punta mirando hacia arriba), elimine con cuidado el exceso de aire empujando suavemente el émbolo.



17. Retire cuidadosamente la jeringa para uso oral de la boca del paciente. **Si la dosis prescrita total es mayor de 10 mg, repita los pasos 2 a 17 para acabar de administrar el resto de la dosis.**




18. Deseche la jeringa con los residuos domésticos.

19. Lávese las manos.

Preparación de una dosis de suspensión de AFINITOR utilizando un pequeño vaso



1. Lávese y séquese las manos antes de preparar el medicamento.



2. Llene el vaso dosificador de 30 ml con 25 ml de agua. La cantidad de agua no tiene que ser exacta.



3. Vierta el agua del vaso dosificador en un vaso pequeño (con un volumen máximo de 100 ml).



4. Use unas tijeras para abrir el blíster por la línea de puntos y retire del blíster el número de comprimidos dispersables prescrito.

5. Añada los comprimidos dispersables (un máximo de 5 comprimidos de 2 mg, o 3 comprimidos de 3 mg, o 2 comprimidos de 5 mg) al agua.



6. Espere 3 minutos para que los comprimidos dispersables se disgreguen.



7. Remueva suavemente el contenido del vaso con una cuchara.



8. Beba toda la suspensión inmediatamente. No deje transcurrir más de 60 minutos tras la preparación.



9. Vuelva a llenar el vaso con la misma cantidad de agua (unos 25 ml). Remueva el contenido con la misma cuchara.



10. Beba todo el contenido para tomar el resto del medicamento restante. **Si la dosis prescrita total es mayor de 10 mg, repita los pasos 2 a 10 para acabar de tomar el resto de la dosis.**



11. Lave meticulosamente con agua el vaso y la cuchara. Limpie el vaso y la cuchara con una servilleta de papel limpia y guárdelos en un lugar limpio y seco hasta la próxima dosis.



12. Lávese las manos.

Fabricante: Véase la caja plegable.

Prospecto internacional: Información publicada en: julio de 2021

Novartis Pharma AG, Basilea, Suiza

COSTA RICA	REPÚBLICA DOMINICANA	GUATEMALA	HONDURAS	NICARAGUA	PANAMÁ 5MG	PANAMÁ 10MG	CHILE
Afinitor en comprimidos está indicado para el tratamiento de: Mujeres posmenopáusicas con cáncer de mama avanzado y positividad de receptores hormonales, en combinación con un inhibidor de la aromatasa y después de una hormonoterapia. Pacientes con tumores neuroendocrinos (TNE) avanzados de origen gastrointestinal, pulmonar o pancreático. Pacientes con carcinoma de células renales (CCR) avanzado. Pacientes con complejo de esclerosis tuberosa (CET) asociado a un angiomiolipoma (AML) renal que no requiera cirugía inmediata Afinitor en comprimidos y Afinitor en comprimidos dispersables están indicados para el tratamiento de: Pacientes con CET asociado a un astrocitoma subependimario de células gigantes (ASCG) que no requiera cirugía inmediata	Afinitor en comprimidos está indicado para el tratamiento de: Mujeres posmenopáusicas con cáncer de mama avanzado y positividad de receptores hormonales, en combinación con un inhibidor de la aromatasa y después de una hormonoterapia. Pacientes con tumores neuroendocrinos (TNE) avanzados de origen gastrointestinal, pulmonar o pancreático. Pacientes con carcinoma de células renales (CCR) avanzado. Pacientes con complejo de esclerosis tuberosa (CET) asociado a un angiomiolipoma (AML) renal que no requiera cirugía inmediata Afinitor en comprimidos y Afinitor en comprimidos dispersables están indicados para el tratamiento de: Pacientes con CET asociado a un astrocitoma subependimario de células gigantes (ASCG) que no requiera cirugía inmediata	Afinitor en comprimidos está indicado para el tratamiento de: Mujeres posmenopáusicas con cáncer de mama avanzado y positividad de receptores hormonales, en combinación con un inhibidor de la aromatasa y después de una hormonoterapia. Pacientes con tumores neuroendocrinos (TNE) avanzados de origen gastrointestinal, pulmonar o pancreático. Pacientes con carcinoma de células renales (CCR) avanzado. Pacientes con complejo de esclerosis tuberosa (CET) asociado a un angiomiolipoma (AML) renal que no requiera cirugía inmediata Afinitor en comprimidos y Afinitor en comprimidos dispersables están indicados para el tratamiento de: Pacientes con CET asociado a un astrocitoma subependimario de células gigantes (ASCG) que no requiera cirugía inmediata.	Afinitor en comprimidos está indicado para el tratamiento de: Mujeres posmenopáusicas con cáncer de mama avanzado y positividad de receptores hormonales, en combinación con un inhibidor de la aromatasa y después de una hormonoterapia. Pacientes con tumores neuroendocrinos (TNE) avanzados de origen gastrointestinal, pulmonar o pancreático. Pacientes con carcinoma de células renales (CCR) avanzado. Pacientes con complejo de esclerosis tuberosa (CET) asociado a un angiomiolipoma (AML) renal que no requiera cirugía inmediata Afinitor en comprimidos y Afinitor en comprimidos dispersables están indicados para el tratamiento de: Pacientes con CET asociado a un astrocitoma subependimario de células gigantes (ASCG) que no requiera cirugía inmediata	Afinitor en comprimidos está indicado para el tratamiento de: Mujeres posmenopáusicas con cáncer de mama avanzado y positividad de receptores hormonales, en combinación con un inhibidor de la aromatasa y después de una hormonoterapia. Pacientes con tumores neuroendocrinos (TNE) avanzados de origen gastrointestinal, pulmonar o pancreático. Pacientes con carcinoma de células renales (CCR) avanzado. Pacientes con complejo de esclerosis tuberosa (CET) asociado a un angiomiolipoma (AML) renal que no requiera cirugía inmediata. Afinitor en comprimidos y Afinitor en comprimidos dispersables están indicados para el tratamiento de: Pacientes con CET asociado a un astrocitoma subependimario de células gigantes (ASCG) que no requiera cirugía inmediata	Afinitor en comprimidos está indicado para el tratamiento de: Mujeres posmenopáusicas con cáncer de mama avanzado y positividad de receptores hormonales, en combinación con un inhibidor de la aromatasa y después de una hormonoterapia. Pacientes con tumores neuroendocrinos (TNE) avanzados de origen gastrointestinal, pulmonar o pancreático. Pacientes con carcinoma de células renales (CCR) avanzado. Pacientes con complejo de esclerosis tuberosa (CET) asociado a un angiomiolipoma (AML) renal que no requiera cirugía inmediata. Afinitor en comprimidos y Afinitor en comprimidos dispersables están indicados para el tratamiento de: Pacientes con CET asociado a un astrocitoma subependimario de células gigantes (ASCG) que no requiera cirugía inmediata.	Los comprimidos de Afinitor están indicados para el tratamiento de: Mujeres posmenopáusicas con cáncer de mama avanzado y positividad de receptores hormonales, en asociación con un inhibidor de la aromatasa, después de una hormonoterapia. Pacientes con tumores neuroendocrinos (TNE) avanzados de origen gastrointestinal, pulmonar o pancreático. Pacientes con carcinoma avanzado de células renales. Pacientes con complejo de esclerosis tuberosa (TSC) asociado a un angiomiolipoma renal que no requiere cirugía inmediata. Los comprimidos dispersables de Afinitor están indicados para el tratamiento de: Pacientes con TSC asociado a un astrocitoma subependimario de células gigantes (ASCG) que no requiere cirugía inmediata.	Afinitor en comprimidos está indicado para el tratamiento de: Tratamiento de pacientes con carcinoma de células renales avanzado, en los que la enfermedad ha progresado durante o después del tratamiento con una terapia dirigida al factor de crecimiento del endotelio vascular (VEGF). Mujeres postmenopáusicas con cáncer de mama avanzado con receptores hormonales positivos, HER2-negativos en combinación con exemestano, después del fracaso del fracaso del tratamiento con letrozol o anastrozol. Pacientes con tumores neuroendocrinos (TNE) avanzados de origen gastrointestinal, pulmonar o pancreático. Tratamiento de pacientes con astrocitoma subependimario de células gigantes (ASCG) asociado a esclerosis tuberosa (ET), en quienes requieren intervención terapéutica, pero no son candidatos a la resección quirúrgica curativa. Pacientes con carcinoma de células renales (CCR) avanzado que no responden a la terapia con sunitib o sorafenib. Pacientes con complejo de esclerosis tuberosa (TSC en inglés o CET en español) asociado a un angiomiolipoma (AML) renal que no requiera cirugía inmediata. Afinitor en comprimidos y Afinitor en comprimidos dispersables están indicados para el tratamiento de: Pacientes pediátricos y adultos con Complejo de Esclerosis Tuberosa (TSC) asociado a un astrocitoma subependimario de células gigantes (ASCG) que requiere intervención terapéutica, pero no puede ser curado por resección quirúrgica.

Para Chile: "Para uso exclusivo del profesional de la salud habilitado para prescribir en Chile".
Para Centroamérica, Caribe: "Para uso exclusivo del profesional médico".
Para Nicaragua: Afinitor 5mg (Nicaragua): 01124270113
Afinitor 10mg (Nicaragua): 01124280113

Para ACC: Diríjase al siguiente link para visualizar la información del importador:
<https://www.novartis.com/acc-es/informacion-del-importador> o escanee el siguiente código QR:



Para CANDEAN: Ver información de las fichas técnicas/ información de prescripción de los productos aquí:
<https://www.novartis.com/candean-es/ficha-tecnica-informacion-de-prescripcion>

Para CANDEAN: Ver información de las fichas técnicas/ información de prescripción de los productos aquí:
<https://www.novartis.com/acc-es/ficha-tecnica-informacion-de-prescripcion>

Para CANDEAN; "Para acceder a la información de prescripción del producto escanee el código QR y asegúrese de seleccionar el producto que contenga este material. En caso de no poder visualizarla, solicítela por medio del siguiente correo: informacion.medica@novartis.com"



Para Chile: Para ver el folleto de información al profesional escanee el siguiente código QR:



Para ACC: Para más información médica/científica, favor comunicarse al área de Información Médica de Novartis: informacion.medica@novartis.com.
Si desea reportar un evento adverso ingrese al siguiente enlace: <http://www.novartis.com/report>.

Para Costa Rica y Panamá: "Toda sospecha de reacción adversa y falla terapéutica se debe notificar al Centro Nacional de Farmacovigilancia (CNFV) en los formularios y plazos establecidos en la normativa vigente."

Content ID: FA-11362701
Fecha Producción: Mayo 2025
Fecha de expiración: 18/12/2027

